

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Producto tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

Nota al médico

DL₅₀ oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

Nota al comprador

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



PRO PHYT ÁCAROS

(i.a. Extracto de *Sophora flavescens* + Extracto de *Allium sativum*)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Ingredientes activos:

Extracto de *Sophora flavescens*.....48 g/L

Extracto de *Allium sativum*.....50 g/L

Aditivos.....C.s.p. 1 L

ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

FORMULADOR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com



Fecha de formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **20 L**
Fecha de Vencimiento :

INDICATIVOS DE USO

PRO PHYT® ÁCAROS actúa por contacto causando parálisis en el sistema nervioso de los ácaros. Al aplicar **PRO PHYT® ÁCAROS**, estos dejan de alimentarse y cesa inmediatamente el daño sobre el cultivo y posteriormente mueren.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

Uso específico del producto:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	mL/200L		
Espárrago	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.6	200	ND	Exento ¹ ND ²
Limón	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.4	200	ND	Exento ¹ ND ²
Mango	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.4	200	ND	Exento ¹ ND ²
Mango	Araña bimisculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.4	200	ND	Exento ¹ ND ²
Palto	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1.25-1.88	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.5-0.75	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Tangelo	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.8-2.7	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	200-300	ND	Exento ¹ ND ²
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.67-1.0	200-300	ND	Exento ¹ ND ²

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm
ND: No determinado

1: Extracto de ajo
2: Extracto de *Sophora flavescens*

COMPATIBILIDAD

PRO PHYT® ÁCAROS no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN