

# PRO PHYT ÁCAROS

**ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN**

Extracto de *Sophora flavescens*.....480 g/L  
 Extracto de *Allium sativum*.....500 g/L  
 Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Registro PBUA N° 369 - SENASA**

**Nombre químico:**

**Extracto de *Sophora flavescens***

(CAS): Extracto de *Sophora flavescens*

**Extracto de *Allium sativum***

(CAS): Extracto de ajo

**Fórmula Empírica:**

**Extracto de *Sophora flavescens***


$C_{15}H_{24}N_2O$

**Extracto de *Allium sativum***


$C_6H_{10}S_2$

**Fórmula Estructural:**

**Extracto de *Sophora flavescens***



**Extracto de *Allium sativum***



**TITULAR DEL REGISTRO:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

**FORMULADOR:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

**DISTRIBUIDOR:**

**NOVAGRO-AG S.A.C.**

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**PRECAUCIÓN**

# SIZE: 14.5 x 21.0 cm

## “LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o  
ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PRO PHYT<sup>®</sup> ÁCAROS** actúa por contacto causando parálisis en el sistema nervioso de los ácaros. Al aplicar **PRO PHYT<sup>®</sup> ÁCAROS** estos dejan de alimentarse y cesa inmediatamente el daño sobre el cultivo y posteriormente mueren.

### Uso específico del producto

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Arándano	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.65	0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.65	0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Espárrago	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.6	0.2	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1.25	0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Limón	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.4	0.2	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1.4	0.2	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Arañita biciculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1.4	0.2	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Mango	Ácaro marrón	<i>Oligonychus puniceae</i>	1.25-1.88	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.5-0.75	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Pimiento	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Tangelo	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.67-1.0	0.2-0.3	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>

PC: Período de carencia en días  
LMR: Límite máximo de residuos en ppm  
ND: No determinado

1: Extracto de ajo  
2: Extracto de *Sophora flavescens*

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones por campaña por año con un intervalo de 15 - 20 días.

### PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

### COMPATIBILIDAD

**PRO PHYT<sup>®</sup> ÁCAROS** no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

