

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Usar equipo de protección personal; mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Producto tóxico para los peces.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD  
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

**Nota al médico**

DL<sub>50</sub> oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)  
DL<sub>50</sub> dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata)

**ANTÍDOTO**

No existe antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

**Nota al comprador**

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

# PRO PHYT ÁCAROS

(i.a. Extracto de *Sophora flavescens* + Extracto de *Allium sativum*)

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN**

Ingredientes activos:

Extracto de *Sophora flavescens*.....48 g/L  
Extracto de *Allium sativum*.....50 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

**ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**Registro PBUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.  
Teléfono: +51 (044) 273330.  
ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

**FORMULADOR:**

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.  
Teléfono: +51 (044) 273330.  
ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

**DISTRIBUIDOR:**

**NOVAGRO-AG SAC.**

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.  
Teléfono: +51 (044) 273330.  
ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com



Fecha de formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 1 L  
Fecha de Vencimiento :

**INDICATIVOS DE USO**

PRO PHYT<sup>®</sup> ÁCAROS actúa por contacto causando parálisis en el sistema nervioso de los ácaros. Al aplicar PRO PHYT<sup>®</sup> ÁCAROS estos dejan de alimentarse y cesa inmediatamente el daño sobre el cultivo y posteriormente mueren.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- 1-Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

**Uso específico del producto:**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	mL/200L		
Espárrago	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0,6	200	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Limón	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1,8-2,7	200-300	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	1,4	200	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1,4	200	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Mango	Arañita bimiculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	1,4	200	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Palto	Ácaro marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	1,25-1,88	200-300	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0,5-0,75	200-300	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Tangelo	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	1,8-2,7	200-300	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1,8-2,7	200-300	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0,67-1,0	200-300	ND	Exento <sup>1</sup> ND <sup>2</sup>

PC: Periodo de carencia en días  
LMR: Límite máximo de residuos en ppm  
ND: No determinado

1: Extracto de ajo  
2: Extracto de *Sophora flavescens*

**COMPATIBILIDAD**

PRO PHYT<sup>®</sup> ÁCAROS no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

**PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES**



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

**DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO**

