SIZE: 22.0 x 13.0 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal. -No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera
- de sus partes.
- -Usar equipo de protección personal: mascarilla, quantes, botas y anteoios protectores durante la aplicación
- -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- -Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- -Mantener el producto en su envase original.
- -Ningún envase que hava contenido bio plaquicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- -Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, y ventilado; alejado de fuentes de calor
- -No contaminar las fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

- -En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- -En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar la piel con abundante
- -En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico.
- -En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- -En caso de emergencia llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Después de usar el contenido enjuaque 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



- -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- -No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- -En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRO PHYT ÁCAROS

ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Extracto de Sophora flavescens	48 g/L
Extracto de Allium sativum	
Aditivos	c.s.p. 1 L

Registro PBUA N° 369 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

FORMULADOR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG SAC.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.

Teléfono: +51 (044) 273330.

ventas@novagro-ag.com · www.novagro-ag.com

Fecha de formulación N

de Lote Contenido Neto 1.0 L Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PRO PHYT[®]ÁCAROS actúa por contacto causando parálisis en el sistema nervioso de los ácaros. Al aplicar PRO PHYT ACAROS estos dejan de alimentarse y cesa inmediatamente el daño sobre el cultivo y posteriormente mueren.

Uso específico del producto:

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L	ן אי	LIVIR
Arándano	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.65	0.3	ND	Exento 1 ND2
	Trips	Thrips tabaci	0.65	0.3	ND	Exento 1
Espárrago	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.6	0.2	ND	Exento 1 ND2
Granada	Trips	Thrips tabaci	1.25	0.3	ND	Exento 1 ND3
Limón	Arañita roja	Panonychus citri	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento 1 ND2
Mandarina -	Ácaro del tostado	Phyllocoptruta oleivora	1.4	0.2	ND	Exento 1 ND2
	Arañita roja	Panonychus citri	1.4	0.2	ND	Exento 1 ND2
Mango	Arañita bimiculada	Tetranychus cinnabarinus	1.4	0.2	ND	Exento 1 ND2
Palto	Ácaro marrón	Oligonychus punicae	1.25-1.88	0.2-0.3	ND	Exento 1 ND2
Pimiento	Ácaro hialino	Polyphagotarsonemus latus	0.5-0.75	0.2-0.3	ND	Exento 1
Tangelo -	Ácaro del tostado	Phyllocoptruta oleivora	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento 1 ND2
	Arañita roja	Panonychus citri	1.8-2.7	0.2-0.3	ND	Exento 1 ND2
Vid	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.67-1.0	0.2-0.3	ND	Exento 1 ND2

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

1: Extracto de aio

2: Extracto de Sophora flavecens

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones por campaña por año con un intervalo de 15 - 20

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

1 hora después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

PRO PHYT [®]ÁCAROS no se debe mezclar con materiales alcalinos. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja hacer pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad. Se recomienda trabajar en un pH de 5.0 - 6.0.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



























