

Diagram of a product label for "SATISFY" (Regulador de Crecimiento de Plantas de Uso Agrícola) with dimensions and safety information.

Dimensions:

- Top: 16.5 cm
- Left: 14.4 cm
- Bottom: 60.4 cm
- Right: 15 cm
- Bottom Right: 15 cm
- Bottom Center: 14.5 cm

Label Content:

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO*
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido **SATISFY** debe utilizarse para conservar alimentos o gua para consumo.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No almacenar en casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Almacenar en envase original, bajo sombra, en lugar fresco, seco y ventilado, fuera de la exposición directa al sol.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.
- Teléfono de atención de emergencias toxicológicas: CICOTOX 0800-1-3040, STOLLER PERÚ S.A. 326-0180.

Nota al médico:
DL50 aguda oral = 5,050 mg/Kg DL50 aguda dermal = 2,000 mg/Kg CL50 Inhalatoria = 1.76 mg/L

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el tanque de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Regulador de Crecimiento de Plantas de Uso Agrícola

Concentrado Soluble - SL

Composición

Ácido Indol-3-Butírico.....	0.051 g/L
Kinetina.....	0.092 g/L
Ácido Giberélico.....	0.051 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L.....	1,019.806 g/L

Reg. PBUA N° 028 – SENASA

Titular del Registro: Stoller Perú S.A.
Formulado por: Stoller Enterprises, Inc.
4001 W Sam Houston Pkwy N, Suite 100
Houston, Texas 77043,
Estados Unidos de Norteamérica.

Importado y Distribuido por: Stoller Perú S.A.
Av. Michael Faraday N° 671, Mz. N. Lt 20,
Urb. Industrial Santa Rosa, Ate, Lima 03.
Teléf. 326-0180 • 326-3296 • 326-3180
e-mail: ventas@stoller.com.pe
www.stoller.pe

Contenido Neto: 5 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Modo de acción

- SATISFY** contiene citoquininas, auxinas y ácido giberélico. Las Auxinas son producidas naturalmente en la planta. Cuando se aplica exógenamente es absorbida por las raíces, tallos, hojas y frutos. Las auxinas estimulan la diferenciación de tejidos, induce y promueve el crecimiento de raíces. La efectividad de las auxinas es mejorada cuando es combinada con otras hormonas fisiológicamente activas. Las Citoquininas se producen naturalmente en las plantas. La producción de citoquininas es limitada si las condiciones de estrés afectan el crecimiento de las raíces. Las citoquininas activan la división celular y limitan la síntesis de etileno. Las aplicaciones exógenas de citoquininas estimulan el crecimiento de los brotes y prolongan el ciclo productivo de la planta. El Ácido Giberélico es una hormona producida naturalmente en los tejidos vegetales jóvenes: hojas, primordios, frutos, semillas, flores, raíces, etc. Es transportado en toda dirección por toda la planta. Las aplicaciones exógenas de ácido giberélico son absorbidas a través de las hojas, ramas jóvenes, flores, semillas y frutos y son transportadas hacia las partes de activo crecimiento en la planta.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- SATISFY** puede aplicarse en tratamiento de semilla, crecimiento vegetativo inicial, inicio de floración y cuajado. La frecuencia de aplicación estará en función de las condiciones del clima y cultivo pero de manera general se recomienda aplicar cada 10 a 15 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

- El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- No mezclar con productos fertilizantes y/o productos alcalinos, tales como Caldo bordelés, hidróxidos, etc. Incompatible con ácidos anhidridos, ácidos fuertes, agentes oxidantes y halógenos y productos a base de Aluminio.

FITOTOXICIDAD

- SATISFY** no causa fitotoxicidad cuando es usado a las dosis indicadas en la etiqueta.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Cuadro de Dosificaciones Tratamiento de semillas

Cultivo	Dosis (cc)	Cultivo	Dosis (cc)	Cultivo	Dosis (cc)	Cultivo	Dosis (cc)
Arroz	250 / 50 Kg	Algodón	250 / 50 Kg	Frijol	250 / 50 Kg	Papa	50 / 50 Kg
Aveja	250 / 50 Kg	Espárrago	100 / 1 Kg	Maíz	250 / 50 Kg	Zapallo	50 / 50 Kg

Icons:

- Corrosive (C)
- Flammable (F)
- Explosive (E)
- Health Hazard (Xn)
- Environment (N)
- Acute Toxicity (T+)
- Other (O)

Aplicación foliar					
Cultivo	Dosis		Momento de aplicación	UAC	LMR
	L/Ha	L/200 L			
Arvejas, Frijol, Vainitas	0.50		Al aparecer la 4ta. hoja. 15 días después de la primera aplicación. Repetir 3 veces la aplicación cada 20 días.	0.5 día	N/A
Brócoli, Coliflor, Col (crucíferas)	0.50		A la 4ta. hoja. Repetir 6 veces la aplicación, cada 15 días.	0.5 día	N/A
Apio	0.30		Cuando la planta tenga 30 cm. de altura. Hacer dos aplicaciones cada 20 días.	0.5 día	N/A
Ajo, Cebolla	0.50		Cuando la planta tenga 10 cm. de altura.	0.5 día	N/A
Pimiento	0.50		Al trasplante. Repetir la aplicación por 5 veces cada 20 días.	0.5 día	N/A
Tomate	0.50		Al trasplante. Repetir la aplicación 5 - 6 veces cada 15 - 20 días.	0.5 día	N/A
Maiz	1.00		Al aparecer la 4ta. hoja. Repetir la aplicación al inicio de la floración.	0.5 día	N/A
Marigold	0.50		Al aparecer la 4ta. hoja. Repetir la aplicación 5 veces cada 20 días.	0.5 día	N/A
Espárrago	0.50 - 1.00		Aplicar con la aparición de cada brote.	0.5 día	N/A
Papa	1.0		Empezar la aplicación después de la aparición de la 4ta. hoja. Repetir la aplicación cada 15 días hasta antes del chapodo.	0.5 día	N/A
Durazno	0.50 - 1.00	0.20	Iniciar la aplicación a la ruptura de la dormancia. Repetir cada 15 días hasta la cosecha.	0.5 día	N/A
Vid	1.0	0.25 - 0.50	Iniciar la aplicación a la ruptura de la dormancia. Repetir cada 20 días hasta un máximo de 6 veces.	0.5 día	N/A
Manzanas, Peras	0.50 - 1.00	0.50	Iniciar aplicación a la ruptura de la dormancia. Repetir la aplicación cada 15 días hasta la cosecha.	0.5 día	N/A
Cítricos (Limón, Naranja, Mandarina)	2.0	0.50 - 1.00	Aplicar a la primera floración y luego repetir con la aparición de cada nuevo brote.	0.5 día	N/A
Fresas	0.25		A la primera flor aplicar 250 cc/Ha, repetir por 5 veces la aplicación	0.5 día	N/A
Bananas, Plátanos	2.0	1.0	Iniciar las aplicaciones antes de la aparición de la flor en cada planta. Continuar las aplicaciones hasta la cosecha de cada planta.	0.5 día	N/A
Alfalfa	1.0		Aplicar a la aparición de la 4ta. hoja . 5 - 15 días después de cada corte.	0.5 día	N/A
Betarraga	0.25		Iniciar las aplicaciones con la 5ta. hoja. Continuar las aplicaciones a intervalos de 15 días.	0.5 día	N/A
Algodón	1.0		Iniciar las aplicaciones al inicio de la floración. Repetir cada 15 días hasta el cuajado de bellotas.	0.5 día	N/A
Arroz	0.50		Iniciar aplicaciones con la 4ta. hoja. Repetir cada 15 días hasta inicio de espiga	0.5 día	N/A

U.A.C. = Última Aplicación antes de la cosecha L.M.R.= Límite Máximo de Residuos N.A.= No Aplicable. Exento de tolerancia.
SATISFY contiene aproximadamente 5.1 mg de Auxinas, 9.2 mg de Citquininas y 5.1 mg de Ácido Giberélico por cada 100 mL de producto comercial

12.6 cm

15.8 cm