



| Aplicación foliar                    |             |             |                                                                                                                                       |              |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cultivo                              | Dosis       |             | Momento de aplicación                                                                                                                 | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|                                      | L/Ha        | L/200 L     |                                                                                                                                       |              |              |
| Arvejas, Frijol, Vainitas            | 0.50        |             | Al aparecer la 4ta. hoja. 15 días después de la primera aplicación. Repetir 3 veces la aplicación cada 20 días.                       | 0.5 día      | N.A.         |
| Brócoli, Coliflor, Col (crucíferas)  | 0.50        |             | A la 4ta. hoja. Repetir 6 veces la aplicación, cada 15 días.                                                                          | 0.5 día      | N.A.         |
| Apio                                 | 0.30        |             | Cuando la planta tenga 30 cm. de altura. Hacer dos aplicaciones cada 20 días.                                                         | 0.5 día      | N.A.         |
| Ajo, Cebolla                         | 0.50        |             | Cuando la planta tenga 10 cm. de altura.                                                                                              | 0.5 día      | N.A.         |
| Pimiento                             | 0.50        |             | Al trasplante. Repetir la aplicación por 5 veces cada 20 días.                                                                        | 0.5 día      | N.A.         |
| Tomate                               | 0.50        |             | Al trasplante. Repetir la aplicación 5 - 6 veces cada 15 - 20 días.                                                                   | 0.5 día      | N.A.         |
| Maiz                                 | 1.00        |             | Al aparecer la 4ta. hoja. Repetir la aplicación al inicio de la floración.                                                            | 0.5 día      | N.A.         |
| Marigold                             | 0.50        |             | Al aparecer la 4ta. hoja. Repetir la aplicación 5 veces cada 20 días.                                                                 | 0.5 día      | N.A.         |
| Espárrago                            | 0.50 - 1.00 |             | Aplicar con la aparición de cada brote.                                                                                               | 0.5 día      | N.A.         |
| Papa                                 | 1.0         |             | Empezar la aplicación después de la aparición de la 4ta. hoja. Repetir la aplicación cada 15 días hasta antes del chapodo.            | 0.5 día      | N.A.         |
| Durazno                              | 0.50 - 1.00 | 0.20        | Iniciar la aplicación a la ruptura de la dormancia. Repetir cada 15 días hasta la cosecha.                                            | 0.5 día      | N.A.         |
| Vid                                  | 1.0         | 0.25 - 0.50 | Iniciar la aplicación a la ruptura de la dormancia. Repetir cada 20 días hasta un máximo de 6 veces.                                  | 0.5 día      | N.A.         |
| Manzanas, Peras                      | 0.50 - 1.00 | 0.50        | Iniciar aplicación a la ruptura de la dormancia. Repetir la aplicación cada 15 días hasta la cosecha.                                 | 0.5 día      | N.A.         |
| Cítricos (Limón, Naranja, Mandarina) | 2.0         | 0.50 - 1.00 | Aplicar a la primera floración y luego repetir con la aparición de cada nuevo brote.                                                  | 0.5 día      | N.A.         |
| Fresas                               | 0.25        |             | A la primera flor aplicar 250 cc/Ha, repetir por 5 veces la aplicación                                                                | 0.5 día      | N.A.         |
| Bananas, Plátanos                    | 2.0         | 1.0         | Iniciar las aplicaciones antes de la aparición de la flor en cada planta. Continuar las aplicaciones hasta la cosecha de cada planta. | 0.5 día      | N.A.         |
| Alfalfa                              | 1.0         |             | Aplicar a la aparición de la 4ta. hoja . 5 - 15 días después de cada corte.                                                           | 0.5 día      | N.A.         |
| Betarraga                            | 0.25        |             | Iniciar las aplicaciones con la 5ta. hoja. Continuar las aplicaciones a intervalos de 15 días.                                        | 0.5 día      | N.A.         |
| Algodón                              | 1.0         |             | Iniciar las aplicaciones al inicio de la floración. Repetir cada 15 días hasta el cuajado de bellotas.                                | 0.5 día      | N.A.         |
| Arroz                                | 0.50        |             | Iniciar aplicaciones con la 4ta. hoja. Repetir cada 15 días hasta inicio de espiga                                                    | 0.5 día      | N.A.         |

P.C.: Periodo de carencia (días)    L.M.R.= Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)    N.A.: No Aplica.  
**SATISFY** contiene aproximadamente 5.1 mg de Auxinas, 9.2 mg de Citoquininas y 5.1 mg de Ácido Giberélico por cada 100 mL de producto comercial

12.6 cm

15.8 cm