

28,00 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados, después consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados y báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, entonces dar respiración artificial.

NOTA AL MÉDICO:

- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Telefonos de emergencia:

SAMU: 106 / AGRO UNITEK CROPS SCIENCE S.A.C.: 961925844

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Uniclave

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Composición:

Uniconazole.....50 g/L

Aditivos.....csp 1 L

Reg. RCP N° 031 - SENASA

Titular del registro:
AGRO UNITEK CROPS SCIENCE S.A.C.



Formulado por:
NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
9th Floor No. 58 Nanhui Road 210017 Nanjing

F. de Form:
N° Lote:
Contenido Neto: **1L**
F. de Venc:

Importado y distribuido por:
Innovaciones y Formulaciones S.A.C.



Av. Tambo Rio Lote 16a Fnd.
Chacra Cerro Comas, Lima-Perú
Tel.: 562-9116 Fax.: 562-9116

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

UNICLAVE® es un regulador de crecimiento del grupo de los triazoles, que es absorbido por las raíces y tallos, con translocación en el xilema a los puntos de crecimiento de la planta. Actúa inhibiendo la biosíntesis de giberelinas disminuyendo el crecimiento vegetativo y la competencia entre brotes vegetativos y flores, favoreciendo de forma indirecta el desarrollo de los futuros frutos cuajados de palto.

Para la preparación de la mezcla, agitar el producto en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia, de tal modo que se forme una suspensión uniforme y luego complete con agua hasta obtener el volumen deseado.

Se debe aplicar con equipos tractorizados dirigidos a la parte aérea, produciendo gotas finas en forma de lluvia o rocío evitando el escurrimiento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Modo de Acción	Dosis (L/ha) *			PC (días)	LMR (ppm)
		Total	Por Aplicación			
			1° *	2° **		
Palto	Evita la caída prematura de frutos durante el cuajado y maduración. Mejora el rendimiento y calidad del fruto.	6	3	3	90	0.02

PC: Período de carencia /
* En floración (50% de flores abiertas)

LMR: Límite máximo de residuos
** En frutos cuajados

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña (1 campaña por año). Fraccionando la dosis total en dos momentos de aplicación; en floración (50% de flores abiertas) y crecimiento vegetativos de primavera-verano (frutos cuajados).

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.

COMPATIBILIDAD

El producto formulado en un ensayo de mezcla, no demostró ser incompatible con otros fungicidas. Es incompatible con ácidos y álcalis fuertes. El fabricante igualmente recomienda usarlo sólo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



14,60 cm