

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es de cuidado no ingerir.
- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazoles.
- Nota al médico: No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.
- Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito) / CISPROQUIM: 0800-50847 ESSALUD:
117 (gratuito)

Robust®
5 SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:

Uniconazole-p.....52.6 g/L
Aditivos.....csp 1L

Titular del Registro:



Reg. PQUA N° - SENASA

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia,
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Importado y distribuido por:



POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia.
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Contenido Neto: 0.25 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	PC	LMR
		L/Ha	(días)	(ppm)
Mango	Aplicar en la época de maduración de yemas. El método de aplicación es por aspersión y el equipo utilizado es una mochila manual.	0.125 - 1 L	N.A.	0.5

L.M.R: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

P.C.: Período de Carencia en días.

N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación de **ROBUST 5 SC** por campaña al año. En caso de ser necesario, se podrá aplicar como máximo dos aplicaciones, con un intervalo de 15 días. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

