

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- Nota al médico: No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito) / CISPROMQUIM: 0800-50847  
ESSALUD: 117 (gratuito)

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.



**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:  
Uniconazole-p.....52.6 g/L  
Aditivos.....csp 1L

**Reg. RCP N° 032 - SENASA**



**Titular del Registro:**

**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono 348-1018 - 349-9609



**Fabricado y formulado por:**

**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Rm 1203, Mingdu International Tower, 218 Changjiang Road, Jiangyin. China.  
Teléfono: +86(0) 510-80618098  
Fax: +86(0) 510-80618087

**Importado y distribuido por:**

**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Contenido Neto: **200 L**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO                      NO INFLAMABLE                      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ROBUST 5 SC** es un regulador de crecimiento sistémico, perteneciente al grupo de los triazoles, su uso está destinado en campo abierto en el cultivo de mango al momento de la floración para favorecer el cuajado y desarrollo de frutos. **ROBUST 5 SC** tiene efecto en la planta inhibiendo la actividad del ácido giberélico en la planta, desviando los nutrientes hacia una mayor producción.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme.

Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		L/Ha		
Mango	Aplicar en la época de maduración de yemas. El método de aplicación es por aspersión y el equipo utilizado es una mochila manual.	0.125 - 1	N.A.	0.5
Palto	Aplicar en la época de floración, con un 50 a 80% de panículas abiertas.	3 - 4	46	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

P.C.: Periodo de Carencia en días.

N.A.: No aplica.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación de **ROBUST 5 SC** por campaña al año. En caso de ser necesario, se podrá aplicar como máximo dos aplicaciones, con un intervalo de 15 días. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**ROBUST 5 SC** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible en presencia de soluciones alcalinas y ácidos fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

**ROBUST 5 SC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR  
EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es de cuidado no ingerir.
- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Triazololes.
- Nota al médico: No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.
- Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito) / CISPROQUIM: 0800-50847 ESSALUD:  
117 (gratuito)

# Robust®

## 5 SC

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ingrediente activo:

Uniconazole-p.....52.6 g/L

Aditivos.....csp 1L

**Titular del Registro:**



Reg. RCP N° 032 - SENASA

**POINT ANDINA S.A.**

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia,  
II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono 348-1018 - 349-9609

**Importado y distribuido por:** POINT ANDINA S.A.



Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia,  
II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Contenido Neto: 0.25 L  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	PC	LMR
		L/Ha	(días)	(ppm)
Mango	Aplicar en la época de maduración de yemas. El método de aplicación es por aspersión y el equipo utilizado es una mochila manual.	0.125 - 1	N.A.	0.5
Palto	Aplicar en la época de floración, con un 50 a 80% de panículas abiertas.	3 - 4	46	0.1

L.M.R: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

P.C.: Periodo de Carencia en días.

N.A.: No aplica.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación de **ROBUST 5 SC** por campaña al año. En caso de ser necesario, se podrá aplicar como máximo dos aplicaciones, con un intervalo de 15 días. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- Nota al médico: No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.
- Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
ESSALUD: 117 (gratuito)

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, No permitir animales en el área tratada.

**IDENTIDAD:  
Nombre químico(IUPAC):**

Uniconazole-p:


(E)-(RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol

**Fórmula empírica:**

Uniconazole-p:  
C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>ClN<sub>3</sub>O

Peso Molecular: 291.78 gr/mol

**Fórmula estructural:**



**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:**

- Estado físico : Líquido viscoso
- Color : Blanco
- Olor : A solventes
- pH : 6 - 8
- Densidad : 1.005 g/L a 20°C
- Producto : No explosivo
- Inflamabilidad : No inflamable
- Explosividad : No explosivo
- Corrosividad : No corrosivo
- Estabilidad : El producto presente 2 años como mínimo en el empaque original sellado.

**Robust**<sup>®</sup>  
5 SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición Química:**

Uniconazole-p.....52.6 g/L  
Aditivos .....csp1 L

Reg. RCP N°032 - SENASA

**Titular de Registro:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

**Fabricado y formulado por:**  
**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Rm 1203, Mingdu International Tower, 218 Changjiang Road,  
Jiangyin, China.  
Teléfono: +86(0) 510-80618098  
Fax: +86(0) 510-80618087



**Importado y distribuido por:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

**CONTENIDO NETO: 0.25 L**  
Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ROBUST 5 SC** es un regulador de crecimiento sistémico, perteneciente al grupo de los triazoles, su uso está destinado en campo abierto en el cultivo de mango al momento de la floración para favorecer el cuajado y desarrollo de frutos.

**ROBUST 5 SC** tiene efecto en la planta inhibiendo la actividad del ácido giberélico en la planta, desviando los nutrientes hacia una mayor producción.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme.

Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación de **ROBUST 5 SC** por campaña al año. En caso de ser necesario, se podrá aplicar como máximo dos aplicaciones, con un intervalo de 15 días. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**ROBUST 5 SC** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible en presencia de soluciones alcalinas y ácidos fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

**ROBUST 5 SC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS		LMR (ppm)	PC (días)
		L/ha			
Mango	Aplicar en la época de maduración de yemas. El método de aplicación es por aspersión y el equipo utilizado es una mochila manual.	0.125 - 1		0.5	N.A.
Palto	Aplicar en la época de floración, con un 50 a 80% de particulas abiertas.	3 - 4		0.1	46

L.M.R: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). PC: Periodo de carencia en días. N.A. No aplica.

**Robust**<sup>®</sup>  
5 SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición Química:**

Uniconazole-p.....52.6 g/L  
Aditivos .....csp1 L

Reg. RCP N° 032 - SENASA

**Titular de Registro:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

**Fabricado y formulado por:**  
**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Rm 1203, Mingdu International Tower, 218 Changjiang Road,  
Jiangyin, China.  
Teléfono: +86(0) 510-80618098  
Fax: +86(0) 510-80618087



**Importado y distribuido por:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

**CONTENIDO NETO: 0.25 L**  
Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO