

FUNGIZEB

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Mancozeb.....	800 g/kg
Total.....	c.s.p. 1kg

Registro Nacional PQUA N°

Titular del Registro : RAINBOW AGROSCIENCES SAC

IMPORTADOR:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo N° 670, Oficina C-402,
Santiago de Surco, Lima 33, Perú
rainbowchem@rainbowchem.com
Http://www.rainbowchem.com



FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD

6th Floor, Gaoxinjishhuchuangye Centre Shunhua Road 750#, Jinan
Shandong-China 250101
Tel: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232

25 KG

Contenido Neto

N° de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y boca.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dithiocarbamate**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse con abundante agua fresca como medida de precaución, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Si es inhalado: Retirar a la persona hacia un lugar con aire fresco.
- Recomendaciones generales: Consultar a un médico. Mostrar la etiqueta.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A
CICOTOX 0800-1-3040
ESSALUD 4118000
ESSALUD EN LINEA 0801-10200**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar as fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNGIZEB es un fungicida de contacto, de amplio espectro y acción múltiple para el control de una diversidad de enfermedades fungosas. **FUNGIZEB** se aplica con cualquier equipo de aspersión terrestre. Se prepara la dosis en un recipiente con un poco de agua, agitar bien y luego completar con agua al volumen requerido.

“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Mandarina	Pudrición gris de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	2.5	7	5

PC: Periodo de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **FUNGIZEB** (i.a. Mancozeb) hasta dos aplicaciones como máximo por campaña considerándola una campaña por año, y a un intervalo de 7 a 10 días entre aplicación. Aplicar al inicio de la floración. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacer un cubrimiento de la planta sin llegar al escurrimiento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

FUNGIZEB no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.”

