

178.60 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DIMILIN[®] 25 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Diflubenzuron.....250 g/Kg
 Aditivos.....c.s.p 1 Kg

PQUA N° 463-SENASA**Titular de registro:**

UPL PERÚ S.A.C.
 Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
 Jesús María - Lima - Perú

**Formulador:**

Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd.
 No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development
 Zone, Hebei Province, 063600. China.

Importador y Distribuidor:

Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes N° 311
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.
 Telf: 612-6565 , Fax: 348-1020



Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Contenido neto: **0.5 Kg**
 Fecha de vencimiento:

©Marca Registrada

NO CORROSIVO**NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

188.00 mm

178.60 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: **Benzoylurea**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CISPROQUIM: 080-050-847 UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos en estado larval.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIMILIN® 25 WP, es un nuevo tipo de insecticida que interfiere con la formación de la quitina (principal componente de la cutícula), durante el estado larval de los insectos dificultando la muda.

DIMILIN® 25 WP, se aplica disuelto en agua. Se llena un tercio del depósito a usar con agua se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una suspensión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALGODÓN	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>	300 g/ha (en 400 L de agua)	5	0,2
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	300 g/ha (en 400 L de agua)		
	Gusano perforador de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	400 g/ha (en 400 L de agua) 300 g/ha en poblaciones de 1-2 larvas por mata. 500 g/ha en infestaciones altas		
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	300 g/ha (en 400 L de agua)	5	0,05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar el producto cuando se noten las primeras larvas, en caso de reinfestaciones volver a aplicar. Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **DIMILIN® 25 WP** se puede mezclar con la mayoría de los fungicidas y acaricidas de uso común. Incompatible con productos alcalinos

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



188.00 mm