

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Spinosoides.
En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al Médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
En caso de ingestión: Dé a beber un vaso de agua si está consciente. No induzca el vómito. Nunca dar de beber a una persona inconsciente.
En caso de contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua por lo menos durante 30 minutos. En caso de usar lenetes de contacto remuévalos durante los primeros 5 minutos y continúe el lavado.
En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos.
En caso de inhalación: Mueva a la persona a un sitio donde circule aire fresco, si la persona no está respirando brindar respiración artificial usando un sistema de protección.

Antídoto: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
En caso de emergencia llamar al 0800-13040 CICOTOX / 0800 50847 CISPROQUIM / 0801-10200 ESSALUD (Gratis)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Blackhawk™

WG
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:
Spinosad 360 g/kg
Aditivos csp. 1 kg

Reg PQUA N° 1064-SENASA

Titular del registro: Dow Perú S.A. Av. Arias Araguez 250 Lima 18, Perú. Teléfono: 2084702

FORMULADO POR:

Gowan Milling, Yuma, AZ, bajo especificaciones de
Dow AgroSciences LLC 9330 Zionville Road
Indianapolis, IN 46268 EEUU



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.
Av. Oscar R. Benavides 5915
Callao / LIMA-PERÚ
Teléfono: 5132163



We create chemistry

CONTENIDO NETO: 1 kg

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Blackhawk™ WG es un insecticida formulado a base de Spinosad y que tiene acción oral y por contacto.
Llénesse el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Blackhawk™ WG agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando.
Apliquese Blackhawk™ WG en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		Dosis g/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Páprika	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	100	1	0.2
Espárrago	Gusano perforador de bellotas	<i>Heliothis virescens</i>	125	60	0.2
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30	28 (grano) 7 (follaje)	0.02
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	150	1	0.3
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	100	2	0.3
Vid	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	150	7	0.5
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	125	3	0.4
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	150	1	0.1
Granado	Pococera	<i>Pococera atramentalis</i>	150	7	0.3

** LMR = Límite Máximo de Residuos

* PC = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar Blackhawk™ WG (i.a. Spinosad) como máximo 01 aplicación por campaña, siendo 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Blackhawk™ WG es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

