

350 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Spinosoides.
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al Médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión: Dé a beber un vaso de agua si está consciente. No induzca el vómito. Nunca dar de beber a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua por lo menos durante 30 minutos. En caso de usar lentes de contacto remuévalos durante los primeros 5 minutos y continúe el lavado.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mueva a la persona a un sitio donde circule aire fresco, si la persona no está respirando brindar respiración artificial usando un sistema de protección.

Antídoto: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847. Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: •Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. •No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. •Evitar la deriva por el viento. •Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. •Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto. •Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. •Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. •El producto no debe aplicarse en zonas con napas freática superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Blackhawk™ WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición: Spinosad..... 360 g/kg
Aditivos.....csp. 1 kg

Reg PQUA N° 1064-SENASA

Titular del registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

FORMULADO POR:
Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268 EEUU



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.
Av. Oscar R. Benavides 5915
Callao / LIMA-PER
Teléfono: 5132163



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

™ © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Blackhawk™ WG es un insecticida formulado a base de Spinosad y que tiene acción oral y por contacto. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Blackhawk™ WG agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese Blackhawk™ WG en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		Dosis g/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Páprika	Heliothis	<i>Heliothis virescens</i>	100	1	0.2
Espárrago	Gusano perforador de bellotas	<i>Heliothis virescens</i>	125	60	0.2
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	30	28 (grano) 7 (follaje)	0.02
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	150	1	0.3
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	100	2	0.3
Vid	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	150	7	0.5
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	125	3	0.4
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	150	1	0.1
Granado	Pococera	<i>Pococera atramentalis</i>	150	7	0.3

** LMR = Límite Máximo de Residuos. * PC = Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar Blackhawk™ WG (i.a. Spinosad) como máximo 01 aplicación por campaña, siendo 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Blackhawk™ WG es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



92 mm