

PROYECTO DE ETIQUETA – 20 Litros

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: benzoylureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte con el médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No suministrar nada por vía oral si la persona está inconciente.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- Nota al médico: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- **Central de Urgencias y Emergencias de Essalud: 117 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A.: 630-6400.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.



- No reutilizar los envases ni enterrarlos. No disponer con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro e acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

LARVIMEX 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición Química:

Lufenuron 50 g/L
Aditivos..... c.s.p..... 1.0 L

Reg. PQUA N° 281-SENASA

Fabricante y formulador:

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.

9th Floor, No. 58, Nanhu Road, Nanjing

Nanjing, P.C. 210017, China.

Teléfono: +86 (25) 86518999. Fax: +86 (25) 86455985.

Distribuido por:

CropCare S.A.C.

Calle Dean Valdivia No. 148, Piso 7, San Isidro, Lima 27 – PERÚ

Teléfono: (01)630-6420 Fax: (01)630-6410



Titular del registro:

FARMEX S.A.

Av. Rivera Navarrete 620, Piso 10,

San Isidro, Lima. Teléfono: 440-7788.

N° de lote :

Contenido Neto:

Fecha de Fab. :

20 Litros

Fecha de Venc. :



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Larvimex 50 EC es un insecticida selectivo, que actúa por ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina de tal modo que las larvas son incapaces de mudar y dejan de alimentarse, provocando su muerte.

Larvimex 50 EC se aplica en pulverización con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	mL/cil	L/ha		
Alcachofa	Perforador de capitulos	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 250	0,3 - 0,5	7	0,02
<i>Capsicum annuum</i> (pimientos, piquillo, páprika)	Perforador de frutos	<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	0,4 - 0,5	7	0,3
Espárrago	Masticadores de follaje	<i>Copitarsia incommoda</i>	150 - 250	0,3 - 0,5	7	0,02
		<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	0,4 - 0,5		
		<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 250	0,3 - 0,5		

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIONES. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es 14 días o más. Aplicar cuando la población de larvas se encuentre de 2 a 5 larvas por planta.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. Larvimex 50 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

