

Sibu® 250 EC

Composición:
Difenoconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of N° 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Interior
Zona Franca Barranquilla,
Colombia.

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de manipular el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora para manipular, aplicación y para ingresar al área tratada en los primeros 12 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría, a continuación lavar con agua tibia.
 - En contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un médico.
 - En caso de ingestión, lavar con abundante agua. No inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
 - En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición comfortable para respirar. Mostrar la etiqueta del producto.
 - **ANTIDOTO:** No existe un antídoto específico. Brindar tratamiento sintomático de soporte.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01)641-0000.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuáguese varias veces este envase y viértase la solución en la mezcla de aplicación y luego insuflarlo con el triturador u perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sibu 250 EC es un fungicida triazol de efecto preventivo y curativo con movimiento sistémico y gran capacidad translinar. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Emplear suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de la planta, sin llegar al escurrimiento.

Utilizar la dosis baja en aplicaciones preventivas o en inicios de síntomas de la enfermedad, y las dosis altas en caso de mayor incidencia y severidad de la enfermedad.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	0.15 - 0.20	7	1.5
Arándano	Roya	<i>Thekopsora minima</i>	0.20	1	4.0
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.15 - 0.25	30	0.03
Granado	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	0.2	20	0.1
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.20 - 0.25	14	4
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.20 - 0.30	0	0.6
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	0.10 - 0.15	7	3

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **Sibu 250 EC** en arándano y granado una (01) sola vez por campaña y en los demás cultivos hasta dos (02) veces como máximo, considerando una campaña por año, y un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días para papa y 10 días para los demás cultivos.

Momento de aplicación:

Alcachofa: Desde 30 días después del trasplante hasta desarrollo de los capítulos.

Arándano: Desde crecimiento de brotes hasta floración.

Espárrago: Desde desarrollo vegetativo hasta floración.

Granado: Desde el inicio de la floración.

Papa: Desde crecimiento vegetativo (posterior al brotamiento).
Tomate y vid: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Se podrá ingresar al camp

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD
Es compatible con

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos o fuertemente ácidos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONTRACARA

Dimensiones: 140 mm x 150 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA

