

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Sibu® 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Difenoconazole ..... 250 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1404 - SENASA

Titular del Registro,  
Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agricultura Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of N° 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia**  
Calle 1C N° 7-53 Interior  
Zona Franca Barranquilla,  
Colombia.

**CONTENIDO NETO: 5 LITROS**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de manipular el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora, durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría, a continuación lave con agua tibia.
- En contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de ingestión, lavar con abundante agua. No inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administrar nada por la boca a un paciente.
- En caso de inhalación, llevar a la persona al aire fresco y mantenerlo en reposo en una posición confortable para respirar. Mostrar la etiqueta del producto.
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un antídoto específico. Brindar tratamiento sintomático o de soporte.
- **TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sibu 250 EC es un fungicida triazol de efecto preventivo y curativo con movimiento sistémico y gran capacidad translinar.

Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Emplear suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de la planta, sin llegar al escurrimiento.

Utilizar la dosis baja en aplicaciones preventivas o en inicios de síntomas de la enfermedad, y las dosis altas en caso de mayor incidencia y severidad de la enfermedad.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | ENFERMEDAD     |                        | DOSIS (L/200 L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|----------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|           | Nombre común   | Nombre científico      |                 |           |           |
| Alcachofa | Oidio          | Leveillula taurica     | 0.15 - 0.20     | 7         | 1.5       |
| Arándano  | Roya           | Thekopsora minima      | 0.20            | 1         | 4.0       |
| Espárrago | Mancha púrpura | Stemphylium vesicarium | 0.15 - 0.25     | 30        | 0.03      |
| Papa      | Tizón temprano | Alternaria solani      | 0.20 - 0.25     | 14        | 4         |
| Tomate    | Tizón temprano | Alternaria solani      | 0.20 - 0.30     | 0         | 0.6       |
| Vid       | Oidio          | Erysiphe necator       | 0.10 - 0.15     | 7         | 3         |

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar Sibu 250 EC en arándanos una (1) sola vez por campaña y hasta dos (02) veces como máximo para los demás cultivos, considerando una campaña por año, y una frecuencia mínima entre aplicaciones de 15 días para papa y 10 días para los demás cultivos.

#### Momento de aplicación:

Alcachofa: Desde 30 días después del trasplante hasta desarrollo de los capítulos.

Arándano: Desde crecimiento de brotes hasta floración.

Espárrago: Desde desarrollo vegetativo hasta floración.

Papa: Desde crecimiento vegetativo (posterior al brotamiento).

Tomate y vid: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación.

#### PERÍODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos o fuertemente ácidos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad física.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## CONTRACARA

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA

