

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un lugar seco, bien ventilado y cerrado bajo techo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aminofosfonato.

- **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de ingestión:** induzca al paciente al vómito y realizar lavado gástrico.
- **En caso de inhalación:** sacar a la persona del área contaminada y proporcionar aire fresco.
- **En caso de intoxicación:** llamar a un médico inmediatamente, o trasladar al paciente al centro médico más cercano.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico. Todo tratamiento deberá ser sintomático.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX: 0800-1-3040

Aló EsSalud: 472-2300 (emergencias 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos; fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para ese fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

QUIMIFOSATO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Glyphosate 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N°423-97-AG-SENASA

Titular del Registro:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.



Contenido Neto: 20 L

Formulado por:

SERFI S.A.
Av. Diagonal 380,
Ofic.: 701, Miraflores,
Lima - Perú

Importado y Distribuido por:

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

Lote N°:

Fecha Fab.:

Fecha Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

QUIMIFOSATO es un herbicida sistémico, no selectivo para el control de todo tipo de malezas, tanto anuales como perennes. Se usa únicamente en post-emergencia, ya que penetra rápidamente por el follaje (3 a 4 horas).

QUIMIFOSATO al ser aplicado sobre malezas, se transloca a sus estructuras de conservación (estolones, rizomas, bulbos, etc.) obteniéndose un excelente control.

QUIMIFOSATO requiere que las malezas se encuentren en plena actividad fisiológica (suelo húmedo) para favorecer la absorción y translocación del producto dentro de la planta.

QUIMIFOSATO se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá realizar previamente una pre-mezcla colocando agua en un envase, luego vaciar la pre-mezcla en el equipo de aplicación, agregar la cantidad de agua que se va a usar y agitar. Es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua. Mojar bien el follaje para lograr una mejor efectividad y mayor rapidez de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Frutales, Caña de Azúcar, Té, Café, Plátano	Gramma China	<i>Sorghum halapense</i>	2-3	N/A	0.1
	Kikuyo	<i>Pennisetum sp.</i>			
	Gramalote	<i>Panicum purpurascens</i>			
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
	Coquillo	<i>Cyperus sp.</i>			
Espárrago	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	N/A	0.1
	Coquito	<i>Cyperus esculentus</i>	2-3	N/A	0.1
Palto	Coquito	<i>Cyperus esculentus</i>	2-3	N/A	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	2-3	N/A	0.1
Mandarina	Coquito	<i>Cyperus esculentus</i>	2-3	N/A	0.1

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

QUIMIFOSATO debe ser aplicado en post emergencia, cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas. Es aconsejable, para la toma de decisión del correcto momento de aplicación, monitorear el estado de las malezas. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta 12 después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de productos pre y post emergentes de maleza; a excepción de ácidos y bases. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

Por ser un herbicida no selectivo, es fitotóxico a todas las especies de plantas. Aplicar el producto antes de la siembra de los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

