

SULFOTOX

80 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azufre.....800 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° SENASA

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulado por:
**ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND
EXPORT CORPORATION**
No. 37 Qing Chun Road ,
Hangzhou Zhejiang
Province, P.R. China

Importado y distribuido por:

SOCIEDAD ANONIMA ***Fausto*Piaggio**
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 25 Kg

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - Después de usar este producto cambiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Almacenar el producto en lugares frescos secos y bien ventilados, lejos de la casa-habitación.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Tener cuidado en la manipulación del envase para evitar roturas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Inorgánico
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta. No deje solo al paciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 20 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
 - En caso de Inhalación retirar a la persona del area contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: no tiene antídoto específico. Todo tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

Teléfonos de emergencia:
Infosalud: 0800-10828 (emergencia 24 horas)
Cicotox: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398
ESSALUD EN LÍNEA: 4418000
CISPROQUIM : 0800-50876
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS: 117 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para artrópodos benéficos.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5m.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GENERALIDADES:
SULFOTOX 80 WG es un fungicida de contacto cuyo ingrediente activo es azufre, que es un elemento químico no - metálico. Actúa sobre las conidias, conidióforos y micelio al interferir en el proceso de fosforilación oxidativa de ATP. La acción preventiva del azufre se manifiesta sobre las conidias antes y durante la germinación, y parece estar ligada a su actividad sobre los procesos respiratorios.

Agregar **SULFOTOX 80 WG** según la tabla de dosificación al agua. Diluir la bolsa trilaminada en un tercio del agua a utilizar, agitar bien, luego añadir más agua hasta completar el volumen final; agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar **SULFOTOX 80 WG** (i.a. Azufre) hasta tres aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año y una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 12 días. Debe aplicarse **SULFOTOX 80 WG** de manera preventiva cuando se presenten las condiciones ambientales que favorezca el desarrollo de las plagas. La frecuencia y época de aplicación deberá basarse en evaluaciones hecha en campo teniendo en cuenta el umbral de daño económico en el cultivo y la densidad poblacional de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:
No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
SULFOTOX 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicida. Se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	0.8 -1	3.5 - 4	7	50

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

