

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No aplicar cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cyclohexanedione
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 117

Nota al médico: En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. No induzca al vómito. El producto contiene destilados de petróleo. No suministre cosas por vía oral a una persona inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

SELECT® 240 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Clethodim 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. N° 513-97-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Formulado por:

Arysta LifeScience North America, LLC
15401 Weston Parkway, Suite 150,
Cary, NC 27513 USA

Importado y Distribuido por:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01)-630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de vencimiento:



©Marca Registrada

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Para un buen control con **SELECT® 240 EC** es necesario observar que las condiciones de humedad sean adecuadas (mayores al 50%) y la temperatura media se encuentre entre 25 a 35 °C. En periodos prolongados de sequía no se recomienda la aplicación de este producto. No aplique **SELECT® 240 EC** si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

SELECT® 240 EC debe ser emulsionado en agua y aplicado uniformemente sobre la parte aérea de las malezas.

SELECT® 240 EC, es un herbicida post emergente recomendado para el control de maleza gramínea en los cultivos presentados.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	MALEZAS		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Algodón	Lierende puero	<i>Echinochloa colonum</i>	0.75-1.0	15	0.5
	Falsa caminadora	<i>Ischaemum rugosum</i>			
	Guarda rocío	<i>Digitaria sanguinalis</i>			
Soya	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.5-0.75	15	5
	Cadillo	<i>Cenchrus equinatus</i>			
	Caminadora	<i>Rottboellia exaltata</i>			
	Arroz rojo	<i>Oryza sativa</i>			
Algodón	Rabo de zorro	<i>Setaria sp.</i>	0.5-0.75	15	5
Naranja	Gramma china	<i>Sorghum halapense</i>	0.5-0.75	15	5
Manzano	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.5-0.75	15	5
Frijol	Pajilla	<i>Chloris halophylla</i>	0.5-0.75	15	10
Alfalfa	Digitaria	<i>Medicago sativa</i>	0.5-0.75	15	1
Espárrago	Moco de pavo	<i>Echinochloa sp.</i>	0.5-0.75	30	0.5
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus equinatus</i>			
	Digitaria	<i>Digitaria sanguinalis</i>			

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Limite máximo de residuos Agregar aceite agrícola a razón de 2 litros por ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Los mejores resultados se obtienen cuando las malezas están en crecimiento activo, bajo buenas condiciones de humedad y no pasan de 20 a 30 cm de altura. Hacer la aplicación cuando las malezas presenten de 2 a 4 hojas.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Bajo ciertas condiciones ambientales, mezclas de **SELECT® 240 EC** con un herbicida para controlar hojas anchas puede reducir la actividad para el control de malezas gramíneas.

FITOTOXICIDAD

Cuando es usado de acuerdo a las indicaciones y bajo condiciones normales del medio ambiente este producto no es fitotóxico.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO

