

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico si es ingerido.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante la preparación y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en lugar fresco y seco.
- No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas, forrajes o medicinas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para su consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de ingestión acudir al médico, no provocar el vómito si la persona esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos y la piel lavar con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al especialista.
- En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX 328-7398 (Directo) 328-4737 (Central)
CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801-10200
- En caso de envenenamiento tales como náuseas y vómitos acudir al médico.
- Antídoto: No tiene antídoto, se debe proceder mediante un tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Una vez vaciado el contenido del envase, proceda con el triple lavado: enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del DELTAMETHRIN a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FLAME® 2.5% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Deltametrina.....25 g/L
Aditivos c.s.p.....1L

Reg. PQUA N° 1413-AG-SENASA

Titular, importador y distribuidor:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRAGO Y HORTALIZAS

Calle 21 Nro 713 Oficina 205

San Isidro, Lima - Perú

Teléfono (01) 226-7332 225-5951

E-mail: contacto@ipeh.org.pe



Fabricado por:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

Dirección: 15 Huhu Street, Nanjing, Jiangsu, P.R. CHINA

Teléfono: 86-25-86895000

Contenido neto : 20 L

N° Lote:

F. de Fabricación:

F. de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FLAME 2.5% EC es un insecticida que mata a los insectos por contacto directo (penetración cuticular) y a través de la digestión (ingestión oral), paralizando rápidamente el sistema nervioso.

Preparación

Se debe calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar a fin de no tener remanentes después de la aplicación. Antes de su uso se recomienda agitar bien el producto, la preparación de la pre-mezcla se debe realizar en un recipiente pequeño diluyendo bien el producto, para luego agregarlo al equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.5	3	0.05
Alcachofa	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.4 - 0.5	3	0.20

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación cuando se observe la presencia de thrips en grado 02 (01 a 05 thrips por brote) en el caso del cultivo del espárrago. Realizar un máximo de tres aplicaciones por campaña.

En el caso de alcachofa, considerar 01 aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

