

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Triazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión, enjuague la boca en agua. No inducir el vómito ni suministrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos suavemente con abundante agua por 15 minutos y con los párpados abiertos, retirar lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse el área afectada con agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar al paciente al aire libre y dejarlo en reposo. Si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0- 800 -1 -3040

ESSALUD: 411- 8000 Anexo 4, Infosalud: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CAMPO – DIFE

250 EC

Plaguicida Químico de Uso Agrícola

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Difenoconazole..... 250 g/L

Aditivos c.s.p.1L

Registro PQUA N° 1412 - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Jr. Los Mirtos 239, Lince - Lima - Perú.

Teléfonos: + 51 -1 - 222 - 2795

Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: + 86 - 574 - 87301088



Importado y Distribuido por:

INNOVACIONES Y FORMULACIONES S.A.C.

Av. Trapiche Mz.G Lt. 16

Comas, Lima – Perú.

Teléfono: + 51 - 1 - 5629116



Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - DIFE 250 EC, es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Para la preparación de la mezcla llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **CAMPO - DIFE 250 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/Cil	L/Ha		
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.2-0.3	0.4-0.6	7	0.5
Vid	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	0.4	7	4.0
Espárrago	"Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.15	0.14	20	0.03

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **CAMPO - DIFE 250 EC** máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 2 campañas por año, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación puede ser entre 14 a 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CAMPO - DIFE 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

CAMPO - DIFE 250 EC no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

