

BALI®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Azufre 800 g/kg

Aditivosc.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° xxxx - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou
County Zhejiang, China
Tel: +86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684
RUC. 20101637221
RU. N° 141097

Contenido Neto : 10 kg

Lote N° :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Tener cuidado en la manipulación del envase para evitar roturas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Inorgánicos.
- **En caso de intoxicación:** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- **En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- **En caso de contacto con la piel:** retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de ingestión:** no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- **En caso de inhalación:** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
CICOTOX: 0800-13040 / 328-7398 - Atención las 24 horas (gratuito)
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- “Tóxico para artrópodos benéficos”.
- “Peligroso para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- “En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALI es un fungicida de contacto que actúa en forma preventiva controlando *Leveillula taurica* en el cultivo de páprika.

BALI esta compuesto por partículas de azufre, lo que le da una mayor adherencia al follaje y buena persistencia. **BALI**, no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego de remover bien y finalmente completar el volumen del tanque aplicador.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del patógeno. Realizar máximo 1 aplicación por campaña / año.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD:

BALI, puede ser usado solo o en mezclas con otros plaguicidas, ya sea para completar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(kg/200L)	(kg/Ha)		
PÁPRIKA	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.75	1.5	3	50

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

