

"LEACUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia:  
SAMU 106 ; Adama Agriculture Perú S.A. : (01) 641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# Tovli<sup>®</sup> 20 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:  
Acetamiprid ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1415- SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Makhteshim Ltd.**  
P.O. Box 60,  
Beer Sheva 8410001, Israel.

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



**ADAMA**

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Tovli 20 SL es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, presenta alta actividad sistémica y translaminar. Utilizar equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. Realizar la aplicación en condiciones climáticas favorables. Antes de la aplicar, calibrar el equipo y esperar que el follaje seque. Para mayor información ver hoja informativa adjunta.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/ha)		
Mandarina	Minador de la hoja de los cítricos ( <i>Phyllocnistis citrella</i> )	0.1 - 0.15	-	14	1
Pimiento	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	-	0.2 - 0.3	7	0.2
Tomate	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.15 - 0.2	-	7	0.2
Vid	Cochinilla harinosa ( <i>Planococcus citri</i> )	0.15 - 0.2	-	21	0.5

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos  
Para la aplicación del producto, no utilizar más de 800 L agua/ha en el cultivo de mandarina y hasta 400 L agua/ha en el cultivo de tomate

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 10 días para los cultivos de mandarina, pimiento, y tomate. Para el cultivo de vid considerar una (01) aplicación por campaña; en todos los cultivos se considera una (01) campaña al año. Para mayor información ver hoja informativa adjunta.

**PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD**

Ver Hoja Informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones 230 mm x 120 mm

Nota: Esta etiqueta va acompañada de hoja informativa