

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
 Causa irritación moderada a los ojos.
 El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

 No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- No comer beber ni tumar aurante las operaciones de mezcia y aplicación.
 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabán.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 Almaceanor el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados

- almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,
- bebidas ni forrajes.

 Ningún envase que haya contenidos plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo
- n siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoide
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. teléfonos de emergencia

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas) CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; ESSALÚD: 0801-10-200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- menos 10 metros.

 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

 En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

 Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención de acetamiprid, a fin de reducir la movilidad y minimizar su lixiviación hacia quias subterráneas.
- hacia aquas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Tovli 20 SL es un insecticida sistémico con movimiento translaminar y
acción de contacto y estomacal. Es un antagonista del receptor
acetilcolina nicotínico, afectando la sinapsis en el sistema nervioso central
de los insectos. La alimentación cesa en minutos a horas y usualmente
dentro de las 24 a 48 horas el insecto muere.

Aplicar con equipo de pulverización terrestre. Utilizar mochila a motor en plantas grandes para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta envés de la hoja en donde se esconden y se alimenta Bemisia tabaci.

Bemisia tabaci.

Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar, para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada. La aplicación debe realizarse en condiciones climáticas favorables (vientos < 10 km/h, temperatura ≤ 30°C, humedad relativa > 60% y plantas no estresadas por falta de agua).

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

	PLAGA				
CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2 - 0.3	7	0.2

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: Dos (02). Considerar una (01) campaña al año.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 10 días.

Momento de aplicación
Pimiento: Utilizar la dosis baja de 0.20 L/ha cuando se presenten los primeros adultos (Máx. 4 individuos/hoja/planta). Utilizar la dosis más alta con presencia alta de la plaga y ninfas (máximo 5 individuos/hoja/planta).

individuos/hoja/planta). Para evitar el desarrollo de resistencia, se recomienda la aplicación no sucesiva del mismo producto y el uso de productos pertenecientes a

PERIODO DE REINGRESO n ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante primeras 24 horas después de la aplicación.

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

Nos fitatóricos de contratorios.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.











Contracara