

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

Esta etiqueta requiere Hoja informativa

### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
  Causa irritación moderada a los ojos.
  El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en

- Torricato personas.
   No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
   No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
   Conservar el producto en el envose original, etiquetado y cerrado.
   Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
   Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, ventilados.

- Grupo químico: Neonicatina de
   En caso de introlección lame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta teléfonas de emergencia para recibir asistencia si es
- SAMU 106; Adama Agriculture Perú S.A. (01) 641-0000.

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopi autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

   Peligroso para artrópodos benéficos.

   Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

   No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

  No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes
- del producto.

  Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al
- menos 10 metros.

   Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir
- religroso para dnimales a omesticos, rauna y nora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
   El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
   En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Tovii 20 SL es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, presenta alta actividad sistémica y translaminar.

Utilizar equipo de pulverización terrestre, gotas finos y cobertura uniforme. Realizar la aplicación en condiciones climáticas favorables. Antes de la aplicar, calibrat el equipo y esperar que el rocio seque. Para mayor información verhaja informativa.

CON	ICILITE	CON	IN INCENIEDO ACPÓNOMO	

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO										
CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC	LMR					
COLIVO	PLAGA	(L/200L)	(L/ha)	(días)	(ppm)					
Mandarina	Minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella)	0.1 - 0.15	1	14	1					
Pimiento	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	-	0.2 - 0.3	7	0.2					
Tomate Mosca blanca (Bemisia tabaci)		0.15 - 0.2	-	7	0.2					
Vid	Cochinilla harinosa ( <i>Planococcus citri</i> )	0.15 - 0.2	-	21	0.5					

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos Para la aplicación del producto, no utilizar más de 800 L agua/ha en el cultivo de mandarina y hasta 400 L agua/ha en el cultivo de tomate

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 10 días para los cultivos de mandarina, pimiento, y tomate. Para el cultivo de vid considerar una (01) aplicación por campaña; en todos los cultivos se considera una (01) campaña al año.

Momento de aplicación

Pimiento y Tomate: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación.

Utilizar la dosis menor cuando se presente los primeros individuos.

Mandarina: Aplicar durante el brotamiento vegetativo. Usar la dosis menor en bajas infestaciones con larvas de primer estadio.

Vid: Aplicar desde el brotamiento hasta el crecimiento de fruto.

Para mayor información ver hoja informativa adjunta

# PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.









# Contracara