

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
 Causa irritación moderada a los ojos.
 El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

 No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- No comer beber ni tumar aurante las operaciones de mezcia y aplicación.
 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Útilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

- almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas,
- bebidas ni forrajes.

 Ningún envase que haya contenidos plaguicidas debe utilizarse para
- conservar alimentos o agua para el consumo n siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoide
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. teléfonos de emergencia

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas) CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; ESSALÚD: 0801-10-200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- menos 10 metros.

 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

 En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

 Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención de acetamiprid, a fin de reducir la movilidad y minimizar su lixiviación hacia quias subterráneas.
- hacia aquas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Tovli 20 SL es un insecticida sistémico con movimiento translaminar y
acción de contacto y estomacal. Es un antagonista del receptor
acetilcolina nicotínico, afectando la sinapsis en el sistema nervioso central
de los insectos. La alimentación cesa en minutos a horas y usualmente
dentro de las 24 a 48 horas el insecto muere.

Aplicar con equipo de pulverización terrestre. Utilizar mochila a motor en plantas grandes para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta envés de la hoja en donde se esconden y se alimenta Bemisia tabaci.

Bemisia tabaci.

Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar, para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada. La aplicación debe realizarse en condiciones climáticas favorables (vientos < 10 km/h, temperatura ≤ 30°C, humedad relativa > 60% y plantas no estresadas por falta de agua).

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA				
	Nombre común	Nombre científico	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.2 - 0.3	7	0.2

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: Dos (02). Considerar una (01) campaña al año.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 10 días.
Momento de aplicación
Pimiento: Utilizar la dosis baja de 0.20 L/ha cuando se presenten los primeros adultos (Máx. 4 individuos/hoja/planta). Utilizar la dosis más alta con presencia alta de la plaga y ninfas (máximo 5 individuos/hoja/planta).

individuos/hoja/planta). Para evitar el desarrollo de resistencia, se recomienda la aplicación no sucesiva del mismo producto y el uso de productos pertenecientes a

PERIODO DE REINGRESO n ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante primeras 24 horas después de la aplicación.

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

No es fitatóricos e la contra

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.









