

ADAMA

Tovli®

20 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Acetamiprid 200 g/L

Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1415- SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:

ADAMA Agriculture Perú S.A.

Av. El Derby N° 254 Of 503.

Santiago de Surco. Lima - Perú.

Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60,

Beer Sheva 8410001, Israel

Contenido neto: 5 Litros

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

Esta etiqueta requiere Hoja informativa

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenidos plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. teléfonos de emergencia para recibir asistencia si es necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)

CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; ESSALUD: 0801-10-200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención de acetamiprid, a fin de reducir la movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Tovli 20 SL es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, presenta alta actividad sistémica y translaminar.

Utilizar equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. Realizar la aplicación en condiciones climáticas favorables. Antes de la aplicar, calibrar el equipo y esperar que el rocío seque. En plantas grandes de pimiento y tomate utilizar mochila a motor para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta envés de la hoja en donde se esconde y alimenta la mosca blanca.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/ha)		
Mandarina	Minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella)	0.1- 0.15	-	14	1
Pimiento	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	-	0.2- 0.3	7	0.2
Tomate	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	0.15-0.20	-	7	0.2

PC.: Período de Carencia

LMR : Límite Máximo de Residuos

N.D.: No Determinado

Para la aplicación del producto, no utilizar más de 800 L agua/ha en el cultivo de mandarina y hasta 400 L agua/ha en el cultivo de tomate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña. Considerar una (01) campaña al año. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 10 días.

Momento de aplicación

Pimiento y Tomate: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación. Utilizar la dosis menor cuando se presente los primeros individuos.

Mandarina: Aplicar durante el brotamiento vegetativo. Usar la dosis menor en bajas infestaciones con larvas de primer estadio.

Para evitar el desarrollo de resistencia, se recomienda la aplicación no sucesiva del mismo producto y el uso de productos pertenecientes a diferentes grupos químicos.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contracara