

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenidos plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre. Administre oxígeno o respiración artificial, si es necesario. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retirar la ropa y los zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Manténganse los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Si tiene lentes de contacto retírelos después de los primeros cinco minutos y continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia si es necesario.
- Teléfonos de emergencia:
SAMU 106 ; Adama Agriculture Perú S.A. : (01)641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención de acetamiprid, a fin de reducir la movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Tovli® 20 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Acetamiprid..... 200 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1415-SENASA

Titular del registro, Importador
 y Distribuidor:

ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of 306.
 Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
 P.O. Box 60,
 Beer Sheva 8410001, Israel.

Contenido neto: **20 Litros**

Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Tovli 20 SL es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, presenta alta actividad sistémica y translaminar.
 Utilizar equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. Realizar la aplicación en condiciones climáticas favorables. Antes de la aplicar, calibrar el equipo y esperar que el rocio seque. En plantas grandes de pimiento y tomate utilizar machila a motor para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta envés de la hoja en donde se esconde y alimenta la mosca blanca.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/ha)		
Mandarina	Minador de la hoja de los cítricos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	0.1 - 0.15	-	14	1
Pimiento	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	-	0.2 - 0.3	7	0.2
Tomate	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.15 - 0.2	-	7	0.2
Vid	Cochinilla harinosa (<i>Planococcus citri</i>)	0.15 - 0.2	-	21	0.5

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
 Para la aplicación del producto, no utilizar más de 800 L agua/ha en el cultivo de mandarina y hasta 400 L agua/ha en el cultivo de tomate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 10 días para los cultivos de mandarina, pimiento, y tomate. Para el cultivo de vid considerar una (01) aplicación por campaña; en todos los cultivos se considera una (01) campaña al año

Momento de aplicación

Pimiento y Tomate: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación. Utilizar la dosis menor cuando se presente los primeros individuos.
Mandarina: Aplicar durante el brotamiento vegetativo. Usar la dosis menor en bajas infestaciones con larvas de primer estadio.
Vid: Aplicar desde el brotamiento hasta el crecimiento de fruto.
 Para evitar el desarrollo de resistencia, se recomienda la aplicación no sucesiva del mismo producto y el uso de productos pertenecientes a diferentes grupos químicos.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 330 mm x 200 mm