

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- ## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Composición:

Acetamiprid.....	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 Litro

Req. PQUA N° 1415-SENASA

Titular del registro, Importador
y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60,
Beer Sheva 8410001, Israel.

Contenido neto: **20 Litros**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Tovli 20 SL es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, presenta alta actividad sistémica y translaminar.

Utilizar equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. Realizar la aplicación en condiciones climáticas favorables. Antes de la aplicar, calibrar el equipo y esperar que el rocío seque. En plantas grandes de pimiento y tomate utilizar mochila a motor para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta envés de la hoja en donde se esconde y valimenta la mosca blanca.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/ha)		
Arándano	Cochinilla harinosa (<i>Planococcus ficus</i>)	0.15	-	3	2.0
Mandarina	Minador de la hoja de los cítricos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	0.1 - 0.15	-	14	1
Pimiento	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	-	0.2 - 0.3	7	0.2
Tomate	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.15 - 0.2	-	7	0.2

P.C.: Período de Carenza LMR : Límite Máximo de Residuos

Para la aplicación del producto, no utilizar más de 800 L agua/ha en el cultivo de mandarina y hasta 400 L agua/ha en el cultivo de tomate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña; con un intervalo mínimo entre aplicaciones de quince (15) días para el cultivo de arándano y diez (10) días para los cultivos de mandarina, pimiento, y tomate. En todos los cultivos se considera una (01) campaña al año.

Momento de aplicación

Arándano: Aplicar desde el brotamiento hasta la floración.

Pimiento y Tomate: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación. Utilizar la dosis menor cuando se presente los primeros individuos.

Mandarin: Aplicar durante el brotamiento vegetativo. Usar la dosis menor en bajas infestaciones con larvas de primer estadio.

Para evitar el desarrollo de resistencia, se recomienda la aplicación no sucesiva del mismo producto y el uso de productos pertenecientes a diferentes grupos químicos.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Dimensiones: 330 mm x 200 mm