LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES YADVERTENCIAS DE USO YAPLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua v jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- PRIMEROS AUXILIOS

 Grupo Químico: Aryloxyphenoxy propionate (FOPs)

 En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.

 En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.

 En caso de contacto con los jojes, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua
- y jaton.

 En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- · Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398 ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solució en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.

 Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos
- acuáticos.

 Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

 Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos
- meables.

- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA



CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Cyhalofop butyl: 180 g/L Aditivos: csp 1 L

Reg. PQUA Nº - SENASA



Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar, San Isidro Teléfono: 222-2695

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERU S.A.C Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú Teléfono: (01) 6173300

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Contenido Neto: 500 ml ZIBO NAB AGROCHEMICALS LIMITED North of National High – tech industrial F. de Form: Nº Lote: Development Zone, ZIBO, Shandong, China 256410 F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

L-UNICO" es un herbicida graminicida post emergente selectivo, ingresa por las hojas, se mueve a través del floema y se acumula en los meristemos.

L-UNICO" inhibe la acetyl Co enzima A carboxilasa (ACCase) afectando el crecimiento celular. Deteniendo el desarrollo de las malezas, las cuales finalmente mueren.

L-UNICO® Aplicar con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	РС	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
ARROZ	Cadillo Grama Moco de pavo Pata de gallina	Cenchrus echinatus Leptochloa uninervia Echinochloa cruz- galli Eleusine indica	1.0 – 1.5	60	0.02

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

L-UNICO® se aplica una vez por temporada de cultivo. Aplicar cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento (1 a 5 hojas) y cuando el cultivo se encuentre en

desarrollo vegetativo. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, 1 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

L-ÚNICO® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con el herbicida Propanil, herbicidas para el control de hoias anchas y ciperáceas, tales como 2,4-D, loxinil, Triclopyr, Bispyribac-Na, Bentazon, Sulfonilúreas en general. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

L-UNICO® no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.













LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**









