

“LEALA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado, cerrado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Fosfonatos.
 - En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar al paciente con agua no inducir al vómito.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarlo con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.
 - No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
- TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
INFOSALUD : 0800-10-828
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
AVGUST PERU SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del presente envase inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Seal® 80WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Fosetyl aluminium 800 g/Kg
 Aditivos c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N° 1302 - SENASA

Titular de Registro:
AVGUST PERU SAC
 Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.
 Formulado por:
 Kinyield Industry Co. Limited.
 Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble road. Hong Kong - China.

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 25 Kg
 Lote N°:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SEAL 80 WP**, es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de las planta, con ambos tipo de translocación acropétala y basipétala.
- Para la preparación, vierta la cantidad de **SEAL 80 WP**, en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Cil	Kg/Ha		
Limón , Mandarina	Gomosis del cuello	<i>Phytophthora nicotianae</i>	0.75	-	30	75
Palto	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5 - 0.75	3.0 - 3.75	15	50
Pimiento	Azul o hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	0.7	-	15	130
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	0.4 - 0.5	-	15	100

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- **Aplicar SEAL 80 WP** cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación. En caso se requiera una tercera aplicación usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

20 cm

35 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

