

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es mortal si se ingiere y muy peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o la aspersión y el contacto con ojos, piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Derivados de la glicina (Phosphonoglycine)

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar toda la ropa contaminada y lavar completamente la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación, retirar al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CICOTOX: (01) 328-7700

CORPORACIÓN GREEN VALLEY: 044-319037

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SAHARA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

Glifosato, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos csp 1 L

Registro PQUA N° 1422 - SENASA

Titular del Registro:

CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC

RUC: 20492612767

Calle A. Mza B. Lote 9 .Int. 202. Urb. Z.I. Pro 9no.

Sector - Lima - Lima - San Martín de Porres.

www.cgreenvalley.com



Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO. LTD.

N°26 Majia Street, Nanjing Jiangsu,

210009 China.Teléfono/ Fax: 0086-25-83303203

Importado y distribuido por:

CONSORCIO OMNICROP SAC

RUC: 20559660796

Mza. N lote. 7 urb. Natasha Alta

La Libertad - Trujillo - Trujillo

Contenido Neto: 20 L

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SAHARA es un herbicida sistémico, no selectivo, pos- emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos que las malezas requieren su desarrollo, causando su muerte finalmente.

SAHARA se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Gramma china Coquito Cola de zorro Amor seco	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Bidens pilosa</i>	3	5	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar siempre en post emergencia sobre las malezas que presentan al menos 2 - 4 hojas, que no hayan alcanzado la floración o fructificación.
- Aplicar máximo 1 aplicación/campaña; considerando 1 campaña/año, aplicar sobre la zona de goteo y entre las calles.
- Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.
- En caso se requiera una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferencia mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los herbicidas e insecticidas, excepto con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otras, así como con herbicidas de tipo hormonal que se absorben, fenoxi y otras, ya que pueden modificar o reducir el efecto del glifosato.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

