

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, bañese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Un contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carboxamide.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En ingestión, **NO PROVOQUE EL VÓMITO**, ni le administre nada por la boca si está inconsciente.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia

TELÉFONOS DE CICOTOX 0800-1-30-40; ESSALUD 0801-10200
CISPROQUIM 0800-50-847

Fontelis®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Penthiopyrad..... 200 g/l
Aditivos..... C.S.P. 1 Litro

Registro PQUA N°

Titular del Registro: DuPont DuPont Perú S.A.C.
Av. República de Panamá 3531,
Df. 1203 - Lima 27
Lima - Perú

Formulado por:
E.I. du Pont de Nemours and Company
Centro de Manufacturación Valdosta
2509 Rocky Ford Road
Valdosta, GA 31601
USA



No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 500 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company

Distribuido por:
FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima 39.
Tel: 6141500 Fax : 6141517; 6141516
Perú



INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Fontelis® es un fungicida traslaminar y sistémica a nivel local; su ingrediente activo Penthiopyrad, inhibe la respiración de los hongos a nivel mitocondrial, lo cual conlleva al detenimiento de procesos celulares, germinación, crecimiento micelial y causan la muerte final del hongo.

Fontelis® se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad del volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y aplicar realizando una buena cobertura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis l/ha	PC. días	LMR ppm
Cebolla	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25	3	0.7
Tomate	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.00	3	2.0
Pimentón	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25	3	2.0
	Oidiopsis	<i>Leveillula taurica</i>	1.00		

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga, de manera preventiva, cuando se observen los primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan su desarrollo, evitar presiones severas de la enfermedad ya que el desempeño puede no ser el esperado.
- Como máximo 2 aplicaciones/campaña. Considerando 1 campaña al año.
- En tomate, realice aplicaciones preventivas con intervalo de 25 a 30 días.
- En Cebolla, realice aplicaciones preventivas con intervalo de 28 días.
- En Pimiento, realice aplicaciones preventivas con intervalo de 15 a 20 días.
- Dosis máxima de aplicación 1.25 L/ha.
- De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia (Fontelis® pertenece al Grupo Químico 7 de la Clasificación FRAC). Realizar las aplicaciones de Fontelis® dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, combinándolo con buenas prácticas de control biológico, cultural y genético.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD (Ver hoja informativa)
FITOTOXICIDAD (Ver hoja informativa)

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

120 mm



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



217 mm



Ficha Técnica para etiqueta DuPont, información clasificada.

Descripción del Layout:

Etiqueta Couche Adhesivo, impresión en Off-Set, para presentación de botella de 500ml.

Medidas: Milímetros.

Alto:
120mm

Largo:
235mm

Tolerancia:
1mm +/-

Cotas:

Línea de corte _____
Línea de área de texto - - - - -
Radio de esquinas de etiqueta Ø 1/8

Fecha de Revisión:
06-dic-2015

País:
Perú

Colores:
PMS: rojo 186, azul 293, verde 349, azul 7459 y negro 100%

Código A Vigente:
N/A

Razón de Cambio:

Código A Obsoleto:
N/A

CORRECCIONES PERU