

Fontelis®
PLAUCIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:
Penthiopyrad..... 200 g/l
Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N°

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company

Uso: Fungicida agrícola

Grupo químico:
Pirazol Carboxamidas - Grupo Químico 7 - FRAC

Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada SC


Registro PQUA N°:

Nombre Ingrediente Activo: Penthiopyrad: 200 g/l

Nombre químico (IUPAC):
(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide

Fórmula Empírica: C₁₈H₂₉F₃N₃S

Peso Molecular: 359.41 g/mol



Estado físico: Líquido
Color: Blancuzco
Olor: Ligero a Ester
pH: 6.66

Capacidad y clase de envase: 500 ml

Nombre del Titular del Registro:

DuPont Perú S.A.C.
Av. República de Panamá 3531,
Of. 1203 - Lima 27
Lima - Perú



Nombre del Formulator:

E.I. du Pont de Nemours and Company
Centro de Manufacturación Valdosta
2509 Rocky Ford Road
Valdosta, GA 31601
USA



Nombre del Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos – Lima 39.
Tel: 6141500 Fax : 6141517; 6141516
Perú

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

“LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, bañese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Un contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carboxamide.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ni le administre nada por la boca si está inconsciente.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia

TELÉFONOS DE CICOTOX 0800-1-30-40;
ESSALUD 0801-10200
CISPROQUIM 0800-50-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo o haya expectativa de lluvia dentro de las 48 horas siguientes a la aplicación.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Fontelis® es un fungicida traslaminar y sistémica a nivel local; su ingrediente activo Penthiopyrad, inhibe la respiración de los hongos a nivel mitocondrial, lo cual conlleva al deteniimiento de procesos celulares, germinación, crecimiento micelial y causan la muerte final del hongo.

Fontelis® se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente y aplicar realizado una buena cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis l/ha	PC. días	LMR ppm
Cebolla	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25	3	0.7
Tomate	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.00	3	2.0
Pimentón	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25	3	2.0
	Oidiopsis	<i>Leveillula taurica</i>	1.00		

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga, de manera preventiva, cuando se observen los primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan su desarrollo, evitar presiones severas de la enfermedad ya que el desempeño puede no ser el esperado.
- Como máximo 2 aplicaciones/campaña. Considerando 1 campaña al año.
- En tomate, realice aplicaciones preventivas con intervalo de 25 a 30 días.
- En Cebolla, realice aplicaciones preventivas con intervalo de 28 días.
- En Pimiento, realice aplicaciones preventivas con intervalo de 15 a 20 días.
- Dosis máxima de aplicación 1.25 L/ha.
- De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia (Fontelis® pertenece al Grupo Químico 7 de la Clasificación FRAC). Realizar las aplicaciones de Fontelis® dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, combinándolo con buenas prácticas de control biológico, cultural y genético.

Métodos de Aplicación:

Aspersión Foliar

Las dosis establecidas en la etiqueta fueron determinadas utilizando un volumen de aplicación promedio de 500 litros de agua por hectárea para el pimentón, 520 litros de agua por hectárea para la cebolla y un promedio entre 280 y 380 litros de agua por hectárea en aplicaciones a tomates.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. Antes de realizar mezclas, se recomienda hacer una prueba previa para verificar la compatibilidad y selectividad del cultivo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, si se aplica de acuerdo a las recomendaciones dadas en esta etiqueta. Cuando se realiza una primera aplicación del producto se sugiere realizar una prueba en un área pequeña para asegurar que no haya respuesta de fitotoxicidad.

Equipo de aplicación, calibración y preparación de la mezcla

Las mezclas de tanque con otros fungicidas se pueden utilizar para ampliar espectro y / o manejar el potencial de resistencia. Utilice mezclas de tanque con fungicidas eficaces de diferentes modos de acción y que tengan registro para el uso en el mismo cultivo y para la misma enfermedad. No reduzca la dosis recomendada cuando utilice en mezclas.

Limpieza del equipo de aplicación, inmediatamente después de la aplicación, limpiar rigurosamente para reducir el riesgo de formación de depósitos endurecidos en el equipo. Escurrir los excedentes de agua al interior del equipo de aplicación y volver a enjuagar todo el equipo (Mangueras, aguilón y boquillas) con agua limpia y escurrir nuevamente. Se deben tomar todas las precauciones de seguridad necesarias al momento de realizar la limpieza del equipo de aplicación. No limpiar cerca de pozos, fuentes de agua y de la vegetación deseable. Eliminar los residuos agua de enjuague de acuerdo con las reglamentaciones locales.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Ficha Técnica para etiqueta DuPont, información clasificada.

Descripción del Layout: Layout DFU Folder Estandar			Fecha de Revisión: 06-dic-2015	
Medidas en milímetros Hoja desdoblada:			País: Perú	
Alto: 120mm	Largo: 240 mm	Tolerancia: 1mm +/-	Colores: PMS: rojo 186, azul 293, verde 349, azul 7459 y negro 100%	
Medidas en milímetros Doblado Final:			Código A Vigente: N/A	Razón de Cambio: CORRECCIONES PERU
Alto: 60mm	Largo: 60mm	Tolerancia: 1mm +/-	Código A Obsoleto: N/A	
Cotas: Línea de corte Línea de área de texto Área de doblado final				