

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de Emergencia: **CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398. ESSALUD: 0801 - 10200. HORTUS S.A.: 717-9040 / 717-9041.**



Contenido Neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

v20151204

CANDADO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN - ACEITE EN AGUA - EW

Composición:
Penconazole..... 200 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
 anasac
Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile
Teléfono: (56 2) 24706800
Fax: (56 2) 24689100

Importado y distribuido por:
 hortus
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CANDADO es un fungicida formulado como emulsión aceite en agua (EW) que contiene 200 g de penconazole por litro de producto formulado.

CANDADO es un fungicida sistémico, que proporcionan una protección amplia al cultivo.

CANDADO, no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego de remover bien y finalmente completar el volumen del tanque de aplicador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Páprika	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.075	30	0.2

PC: Período de Carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma preventiva al ataque de las enfermedades, repitiendo el tratamiento de acuerdo con las condiciones medioambientales.

PERIODO DE REINGRESO: Después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CANDADO, puede ser usado solo o mezclado con otros plaguicidas, ya sea para complementar o reforzar las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

