6"

3"

# RyzUp®

List No. 05370-31-01

**Formulado por:**
VALENT BIOSCIENCES®
Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048 Estados Unidos
1-800-323-9597

**Distribuido por:**
Bayer CropScience
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima - Perú
Telf. 2113800

**Titular del Registro:**
SMTM Perú SAC
Av. República de Panamá 3531
Of. 1203 - Lima 27
T: 511-421-4811

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

Composición:
Ácido giberélico. . . . . 4% p/p*
Aditivos . . . . . 96% p/p

*Equivalente a 32 g de i.a por litro de producto comercial
Reg. PBUA Nº 016-SENASA

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**INFLAMABLE**

**Contenido Neto: 5 Litros**

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

®Marca registrada de Valent BioSciences LLC, U.S.A.
04-9616/R5

**PRECAUCIÓN**

A B C D E F G H I J K

Valent BioSciences
*Prepared by*
MOTT GRAPHICS

LIST NO.
05370-31-01

COMMODITY NO.
04-9616/R5

LABEL EDITOR
C Kelly

DATE
02-11-20

NON-VARNISH AREA
1.25" x 0.75"

COLOR SEPARATIONS
PANTONE 032
PANTONE 347
PANTONE 348
PANTONE 368
BLACK
VARNISH

7-1/4"

3"

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Durante la preparación de la mezcla y la aplicación usar máscara, guantes protectores y ropa adecuada; no comer, fumar ni beber; mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación. Terminada la labor lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. Usar los envases originales y cerrarlos herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- RyzUp es ligeramente tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareo, vómitos, etc., llamar de inmediato al médico más cercano.
- En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico. Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Lávese la piel con abundante agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada antes de volver a usarla. Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
- Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
- Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

DL50 Oral aguda > 5 000 mg/kg DL50 Dermal aguda > 2 000 mg/kg

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:** CICOTOX: 0800-1-3040

**MANEJOY DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

"LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- RyzUp es un regulador de crecimiento, su ingrediente activo es el ácido giberelico o GA3 sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas e influye en su crecimiento y desarrollo.
- RyzUp aumenta la producción, promueve un mejor cuajado de frutos, uniformiza cosechas, retarda la maduración, interrumpe la latencia de tubérculos, semillas y bulbos, induce a la floración.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar de acuerdo a las indicaciones dadas para cada cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:** El ingreso al área tratada puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** No aplicar con productos fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:** Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

List No. 05370-31-01 04-9514/R3

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivos | Dosis ml/cil | Dosis (%) | Objetivos y momento de aplicación | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | 50-100 | — | Mayor crecimiento y producción. Aplicar 2 a 3 veces durante el periodo vegetativo. | 14 | 0.15 |
| Café | 50-100 | — | Uniformizar floración. Aplicar cuando los brotes están hinchando o a la apertura de las primeras flores. | | |
| Naranjo<br>Limonero | 50-100 | — | Uniformizar cosechas y retardar maduración. Aplicar antes del cambio de color de los frutos. No usar en naranja valencia. | | |
| Papa | 5-25 | — | Interrumpe latencia de tubérculos y estimula brotamiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos. | | |
| Tomate | 50-100 | — | Logrará un mejor cuajado de frutos. | | |
| Vid | 125-200 | — | Mayor crecimiento de granos. Las aplicaciones se realizarán según las variedades. Recomendaciones técnicas (ver folleto). | | |
| Pepino, Melón, Zapallo | 50-100 | — | Aumentar la producción. Aplicar al inicio de la floración y 21 días antes de la cosecha. | | |
| Té | 50-100 | — | Aumentar la producción de hojas. Aplicar 2 a 3 veces durante el periodo vegetativo. | | |
| Banano | — | 4.63 | Para prolongar en post cosecha la vida verde del banano, aplicar con una aspersora manual a la corona y las manos o gajos. | | |

*PC = Periodo de Carencia (días) **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

**PRECAUCIÓN**

Mike Krantz

A B C D E F G H I J K

Valent BioSciences
Prepared by
MOTT GRAPHICS

LIST NO. 05370-31-01
COMM. NO. 04-9514/R3
LABEL EDITOR M Krantz
DATE 04-03-17

COLOR SEPARATIONS
PANTONE 306
PANTONE 347
PANTONE 360
BLACK
VARNISH

4/7/17