

# Arte para Caja Rescate SP - 30 Kg.

## "LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

**RESCATE SP** es un insecticida cloronicotínico, que actúa por contacto e ingestión y tiene además acción sistémica. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución:

- No coma, no beba, ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene, ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
- Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS  
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)  
BASF Peruana SA: 513 2505

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilice los envases y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
- Peligroso para los peces: No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGAS                                  |                                                                                                 | DOSIS (gramos) |                   |                 | *P.C.<br>(días) | **L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           | Nombre Común                            | Nombre Técnico                                                                                  | g/ha           | Cilindro<br>200 L | Mochila<br>15 L |                 |                   |
| ALGODON   | Pulgones                                | <i>Aphis gossypii</i>                                                                           | 100 - 150      | 100               | 10              | 7               | 0.7               |
|           | Trips                                   | <i>Macrosiphum euphorbiae</i><br><i>Frankliniella gemina</i><br><i>Caliothrips brasiliensis</i> | 100 - 150      | 100               | 10              |                 |                   |
|           | Mosca Blanca                            | <i>Bemisia tabaci</i>                                                                           | 150 - 200      | 150               | 15              |                 |                   |
|           | Arrebiatado                             | <i>Dysdercus peruvianus</i>                                                                     | 150 - 200      | 150               | 15              |                 |                   |
| LIMON     | Minador de hojas                        | <i>Phyllocnistis citrella</i>                                                                   | 0.05 - 0.10%   | 100 - 200         | ---             | 14              | 1                 |
| MANDARINA | Queresa coma<br>Queresa redonda         | <i>Lepidosaphes beckii</i><br><i>Selenaspidus articulatus</i>                                   | 0.05 - 0.10%   | 100 - 200         | ---             | 14              | 1                 |
| TOMATE    | Mosquilla de los brotes<br>Mosca Blanca | <i>Prodipllosis longifolia</i><br><i>Trialeurodes vaporariorum</i>                              | 200 - 300      | 100 - 150         | 15 - 20         | 14              | 0.1               |
| PIMIENTO  | Mosca Blanca                            | <i>Bemisia argentifolii</i>                                                                     | 200 - 300      | 100               | 10              | 3               | 0.3               |
| PAPRIKA   | Mosquilla de los brotes                 | <i>Prodipllosis longifolia</i>                                                                  | 300 - 450      | 150 - 225         | ---             | ND              | 0.3               |

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carencia (días)

N.D.: No determinado

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**RESCATE SP** es un insecticida que pertenece al nuevo grupo químico de los cloronicotínicos.

**RESCATE SP** posee una alta acción sistémica, que actúa por contacto e ingestión, afectando el receptor acetil Colina Nicotínico de la membrana post sináptica en el sistema nervioso central de los insectos.

**RESCATE SP** tiene como ingrediente activo al Acetamiprid que es una molécula extremadamente activa, que requiere de dosis muy bajas por hectárea para controlar insectos picadores - chupadores y masticadores, lo que le confiere un amplio espectro de acción.

Ponga el insecticida **RESCATE SP** en agua limpia y luego mézclelo hasta que quede completamente diluido, no se debe almacenar el preparado de un día para otro.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se inicien las primeras infestaciones de los insectos plagas, tratando de lograr una buena cobertura.

### PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**RESCATE SP** es compatible con la mayoría de productos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que desee mezclar.

### FITOTOXICIDAD

**RESCATE SP** no presenta fitotoxicidad.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas..

# Rescate® SP

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRICOLA

### POLVO SOLUBLE SP

#### COMPOSICIÓN:

- **Ingrediente activo:**  
Acetamiprid ..... 200 g/Kg
- **Aditivos** ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. N° 373-97-AG-SENASA

Titular del Registro:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU  
Av. José Pardo 513 Of. 701 Miraflores. Lima - Perú. Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

NIPPON SODA CO. Ltd

2-1 Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda ku, TOKIO 100 - 8165 Japón

Importado y Distribuido por:

BASF Peruana S.A.

Av. Oscar R. Benavides N° 5915 Callao 1 - Casilla Postal N° 3911, Lima 100  
Telf.: (01) 513 2500 - Fax: (01) 513 2519



CONTENIDO NETO : 30 Kg.

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

