20.0 ± 0.4 cm

0.9 ± 0.2

0.9 ± 0.2

8.0 ± 0.3 cm

1.2 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Pyrimidinyloxybenzoico**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13040 o 328-7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

ASIGNEE® 400SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Bispyribac Sodium ..... 400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 842 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617 6400.

Contenido neto: 200 mL
Nº de Lote:
F. de Form.: "ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N°23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District , Shanghai, CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ASIGNEE® 400 SC es un herbicida sistémico post-emergente. Actúa como inhibidor de la acetolactato sintetasa interfiriendo en la síntesis de aminoácidos, por lo que inhibe su crecimiento debido que afecta la división celular. Produce clorosis, necrosis hasta la posterior muerte de la planta.

ASIGNEE® 400 SC se diluye en agua; preparar la premezcla con la dosis recomendada, luego completar con el volumen de agua a utilizar. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea.

Se recomienda para el control de malezas gramíneas anuales, de hoja ancha en cultivo de arroz.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Coquito	*Cyperus rotundus*	0.1	14	0.01
	Coquito	*Cyperus difformis*			
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*			

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.