

141.52 mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Difenoconazole 250 g/L
Azoxystrobin 125 g/L
Aditivo: c.s.b. 1L

PQUA N° 1389 - SENASA

Nombre químico:
1-[2-(2-cloro-4-((4-clorofenoxi)fenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-yl)metil]-1,2,4-triazole

Azoxystrobin
Methyl (E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl 3-methoxyacrylate

Fórmula estructural:
Difenoconazole

Azoxystrobin

Fórmula empírica
Difenoconazole: C₁₂H₈Cl₂N₄O₃
Azoxystrobin: C₂₁H₁₈N₄O₆

Peso molecular
Difenoconazole: 408.3
Azoxystrobin: 403.4

Propiedades físico-químicas
Estado físico: Líquido
Color: Blanco a amarillado claro
Olor: Ligero olor

Densidad relativa: 1.10 g/ml
pH: 5.0-6.0

Título de Registro:

Formulador:

Importador y distribuidor:

DEMETRA

DEMETRA GROUP S.A.C.
Calle Gamma Mz. B-7 L-9 Urb. Bocanegra
Distrito de San Juan de los Rios
Telf: 51 1 5754454
www.demetra.com.pe

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No fumar, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento traslaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. Binmaz 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	1* 0.1**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	0.5* 0.5**
Arroz	Piricularia	<i>Piricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5* 0.05**
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	2* 3**
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3-0.4 ^A		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.20	0.3-0.4	7	3* 0.8**
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	7	5* 4**
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-		
Alcachofa	Roya del arándano	<i>Naohidemyces vacchii</i>	-	0.5	7	5* 1**
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5		

P.C.: Periodo de Carenza L.M.R.: Límite máximo de Residuos
^A En 1000 L/ha
^{**} Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Arroz, Vid, Pimiento, Arándano y Alcachofa, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



182.00 mm