

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:	
Azoxystrobin.....	200 g/L
Difenoconazole.....	125 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
 Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyaque
 Jesús María - Lima - Perú
 Telf: 719-4899



Formulador: Kinvel Industry Co. Limited

Unit 905, Workingberg Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 200 L
Fecha de Vencimiento:
@Marca registrada

NO CORROSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se inhala.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Evitar el contacto con la ropa contaminada y lavarse las manos después de usarlo.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
No diseminen ni transporten junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua.
Después de usar el producto, cambíese, lávelo la ropa contaminada y váyase con abundante agua y jabón.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalas después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte al médico.
- En caso de ingestión: no induce náuseas. Consulte inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleva al paciente a un lugar airado. Lejos de silos de contaminación. Si la persona no está respirando, llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca náuseas. Consulte al médico.
- Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106

CISPROQUIM: 080-050-847
ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo tirándolo o perforándolo. Entregue oposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plagas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No eliminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
No aplicar sobre las animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
El producto debe ser almacenado en un lugar seco, fresco, bien ventilado y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: BINNA 325 SC es una fungicida sistémica, de contacto y de movimiento translesional de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de datos. Binres 325 SC es la combinación de los siguientes ingredientes activos: azoxystrobin y difenconazole, lo que le permite un mayor control de las enfermedades fúngicas. El difenconazole actúa como fungicida de contacto, mientras que el azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción translesional) a través de la inhibición de la transferencia de electrones entre cloroplastos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá utilizarse agua limpia y fresca. BINNA 325 SC es un tanque que la mezcla de agua, según bien la recomendación, obtener una solución estable. BINNA 325 SC no debe mezclarse con ningún otro producto. Se recomienda esperar una solución estable antes de aplicar.

Precauciones: Evitar la agitación y aplicar a temperaturas superiores a 15°C.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Nombre común	Plaga	Nombre científico	Dosis L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Papa	Tizón temprano		<i>Alternaria solani</i>	0.2	7	1* 0.1**
Cebolla	Mancha del peral		<i>Sclerotium vesicarium</i>	0.1	3	0.5* 0.5**
Aroz	Piricularia		<i>Piricularia oryzae</i>	-	0.5	30 0.05**
Vid	Oldiosis		<i>Erysine necator</i>	-	21	2* 3**
	Podredumbre gris		<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3-0.4 ^A	3**
Pimiento	Oidium		<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.20	7	3* 0.8**
Arándano	Cabeza de davo		<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	
	Podredumbre gris		<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	5* 4**
	Roya del arándano		<i>Nectriomyces vascellit</i>	-	0.5	
Alcachofa	Oidium		<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5	7 5* 1**

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad: Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.

Para los cultivos de Arroz, Vid, Pimiento, Arándano y Alcachofa realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

a aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

