

MEDIDAS: 14CM X 15.8CM  
ENE.2016  
ML

# TIRA

PANTONE YELLOW C

# TRICUR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Spiroxamine.....  | 250 g/L |
| Tebuconazole..... | 167 g/L |
| Triadimenol.....  | 43 g/L  |
| Aditivos.....     | csp 1 L |

Reg. PQUA N° 1426 - SENASA

Titular del registro:

**MONTANA S.A.**

Formulado por:  
**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
12/F Lucky Building 39  
Wellington Street Central HK

Importado y Distribuido por:  
**MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401  
La Molina, Lima -Perú.  
Teléfonos: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 5L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:

 **MONTANA**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**MEDIDAS: 14CM X 15.8CM**  
**ENE.2016**  
**ML**

# RETIRA

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazole+ Spiroketalaminas.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría. A continuación, lave con agua tibia.
- En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata. Llevar la etiqueta o envase del producto.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
- Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD: 117**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TRICUR es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diferentes puntos de la cadena a nivel de la membrana celular de los hongos.
- TRICUR presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma translinar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antiesporulantes.
- TRICUR puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO               | PLAGA        |                           | DOSIS     |      | PC (días) | LMR (ppm)                                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------------------------|
|                       | Nombre Común | Nombre Científico         | L/200L    | L/ha |           |                                                     |
| <i>Capsicum annum</i> | Oidium       | <i>Leveillula taurica</i> | 0.4       | 1.0  | 38        | 05 Spiroxamine<br>10 Tebuconazole<br>50 Triadimenol |
| Vid                   | Oidiois      | <i>Erysiphe necator</i>   | 0.15-0.25 | -    | 35        | 10 Spiroxamine<br>10 Tebuconazole<br>20 Triadimenol |

PC: Periodo de Carenza  
 LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una buena cobertura sobre toda la planta.
- Realizar como máximo dos aplicaciones con un intervalo de 10 a 14 días entre aplicación por campaña.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

TRICUR es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

#### FITOTOXICIDAD

TRICUR no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm  
Actualizado: ENE.2016  
ML

¡LA CUIDADOSAMENTE ESTÁ ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"¡MANTÉNLA FUERA DE LOS OJOS Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico, no ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No respirar los vapores que se desprenden al manipular el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Limpie la ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar el producto en días de mucho viento, lluvia o granizo.
- Ningún producto que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles-Spóruloicidaminas.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría. Continuar lavando con agua fría o fría con agua limpia por lo menos durante 30 minutos.
- En caso de ingestión: beber abundante agua y lavar la boca con agua limpia.
- Cuando los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de dificultad para respirar.
- En caso de ingestión no inducir el vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
- Nota al médico: No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICTOX (4601-1-3040)  
CISPROQUIM: 0805-56847



PANTONE YELLOW C

**TRICUR**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:  
Soluto activo: 250 g/L  
Triburonaol: 167 g/L  
Aditivos: 43 g/L  
Total: 460 g/L  
Esp. 1 L

Reg. PQUA N° 1426-SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

CASIS AEROSCIENCES LIMITED

Wellington Street Central HK

La Mollina, Lima - Perú

Atención: 011 4192000

E-mail: tricur@montana.com

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°

Fecha de Fab.

Fecha de Exp.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Tricur es un fungicida sistémico de amplio espectro que está habilitado a las distintas de esterilidad de las plantas.
- Tricur presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma translocaria y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Al mismo tiempo posee cualidades antiesporulantes.
- Tricur debe ser aplicado en las partes afectadas, en las partes de salida, en las partes de entrada y en las partes de salida de la planta.
- Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una premezcla en una pequeña cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto del agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el repollo cuente con un buen sistema de riego.

\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\*

| CULTIVO            | PLAGA        |                    | DOSIS     | PC   | LMR   |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------|------|-------|
|                    | Nombre Común | Nombre Científico  | L/2000    | L/ha | (ppm) |
| Caulimorpha ananum | Oidium       | Leveillula taurica | 0.4       | 10   | 38    |
| Ved                | Oidium       | Edible necator     | 0.15-0.25 | -    | 35    |

PC: Período de Curación

LMR: Límite Máximo de Residuos

El límite de registro para esta sustancia es de 10 mg/kg de producto contenido en este empaque correspondiente a las unidades en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





HOJA INFORMATIVA\_RETIRA 24 CM X 6 CM

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el recipiente en agua corriente y deseche en el depósito de residuos sólidos o perforado en los lugares designados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TRICUR es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diferentes puntos de la cadena a nivel de la membrana celular de los hongos.
- TRICUR presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma transláminar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antiesporulantes.
- TRICUR puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (motocila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO          | PLAGA        |                    | DOSIS      |      | PC (dias) | LMR (ppm)                                            |
|------------------|--------------|--------------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------|
|                  | Nombre Común | Nombre Científico  | L/200L     | L/ha |           |                                                      |
| Capicam arriunum | Oidium       | Leveillula taurica | 0.4        | 1.0  | 38        | 0.5 Sproxamine<br>1.0 Iproconazole<br>3.0 Tridemorph |
| Vid              | Oidiolís     | Erysiphe necator   | 0.15- 0.25 | -    | 35        | 1.0 Sproxamine<br>1.5 Iproconazole<br>2.0 Tridemorph |

COMPATIBILIDAD

TRICUR es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea utilizar.

FITOTOXICIDAD

TRICUR no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto y los datos de toxicidad y de seguridad que aparecen en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

