

Medidas: 26 cm x 13.5 cm  
Actualizado: MARZO 2017  
ML

PANTONE YELLOW C

PANTONE BLACK 7C

PANTONE 137 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es dañino, no ingerir.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazole+ Morpholine.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría. A continuación, lave con agua tibia.
- En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicite atención médica inmediata. Llevar la etiqueta o envase del producto.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
ESSALUD: 117  
CICOTOX: 0-800-1-3040  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



**TRICUR**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

**COMPOSICIÓN:**

Spiroxamine.....250 g/L  
Tebuconazole.....167 g/L  
Triadimenol.....43 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA N° 1426 -SENASA

Titular del registro:  
**MONTANA S.A.**

**Formulado por:**  
**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
12/F Lucky Building 39  
Wellington Street Central HK.

**Importado y Distribuido por:**  
**MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401  
La Molina. Lima -Perú.  
Teléfonos: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

**Contenido Neto: 20 L**

**Lote N°:**

**Fecha de Form.:**

**Fecha de Exp.:**

**MONTANA**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **TRICUR** es un fungicida sistémico de amplio espectro que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol en diferentes puntos de la cadena a nivel de la membrana celular del hongo *Leveillula taurica*.
- **TRICUR** presenta propiedades sistémicas dentro de la planta moviéndose en forma translinar y ascendente. Sobre el patógeno tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante. Así mismo posee cualidades antiesporulantes.
- **TRICUR** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA            |                               | DOSIS       |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)                                                      |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Científico             | L/200L      | L/ha |              |                                                                   |
| Pimiento  | Oidium           | <i>Leveillula taurica</i>     | 0.4         | 1.0  | 38           | 0.5<br>Spiroxamine<br>1.0<br>Tebuconazole<br>50<br>Triadimenol    |
| Vid       | Oidiois          | <i>Erysiphe necator</i>       | 0.15 - 0.25 | -    | 35           | 1.0<br>Spiroxamine<br>1.0<br>Tebuconazole<br>20<br>Triadimenol    |
| Espárrago | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.25 - 0.30 | -    | 30           | 0.05<br>Spiroxamine<br>0.05<br>Tebuconazole<br>0.1<br>Triadimenol |

PC: Periodo de Carenza  
LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una buena cobertura sobre toda la planta.
- Realizar como máximo dos aplicaciones con un intervalo de 10 días entre aplicación por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**TRICUR** es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

**FITOTOXICIDAD**

**TRICUR** no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

