

18 cm

OPTIO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin 125 g/L
 Tridemorph 215 g/L
 Aditivos csp 1L

PQUA N° 1427 - SENASA



**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:
 INTEROC S.A.**
 Av. Santa Cruz 875
 Oficina 300 - Miraflores
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú

**Formulador:
 INTEROC S.A.**
 Km. 16.5 Via Daule
 Telf.: (593 4) 288 - 1662
 Guayaquil - Ecuador

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : 250 ml
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	L/200L		
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Rizoctoniasis"	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.5 - 0.6	--	28	5.00 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	--	0.5	98	0.20 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

Azoxystrobin (1), Tridemorph (2)

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

8 cm

1.2 cm

**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

