

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

- Moderadamente irritante a las vías respiratorias y tracto respiratorio.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, usar gafas y equipo de protección.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Solo para aplicación foliar.

- Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Obtener asistencia médica o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y fresca durante 15 minutos, si la irritación persistiera consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Peligroso para abejas y otros polinizadores beneficiosos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto o desechos de envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**RAV®**

# INSECTICIDA AGRÍCOLA

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Imidacloprid..... | 350 g/L   |
| Aditivos .....    | c.s.p 1 L |

**Registro PQUA N° 956 - SENASA**

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**

**AGREVO PERUANA S.A.C.**

Jr. San Sebastián 298,  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**

29F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road,  
Nanjing, China.

**Fecha de Formulación:**

Nº de Lote:

**Contenido neto: 200 L**

**Fecha de vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**RAV**, es un insecticida sistémico elaborado a base de Imidacloprid ingrediente activo que posee acción de contacto e ingestión. Es utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas, las aplicaciones van directamente al foliaje.

**RAV**, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO   | PLAGA                                  |                                    | DOSIS       |        | P.C<br>(días) | L.M.F<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------------|
|           | NOMBRE<br>COMÚN                        | NOMBRE<br>CIENTÍFICO               | L/200L      | L/ha   |               |                |
| ESPÁRRAGO | "Caracha o Mosquilla<br>de los brotes" | <i>Prodioplosis<br/>longifolia</i> | 0.15 - 0.25 | —      | 7             | 0.05           |
| MAÍZ      | "Chinche del maíz"                     | <i>Sthenaridea<br/>carmelitana</i> | 0.15        | 0.225* | 16            | 0.1            |

PC: Periodo de carencia      LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

\*Basado en un gasto de agua de 300L/ha.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar, previa evaluación, cuando se observen los primeros estadios larvales.

**Espárrago:** Realizar 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año.

**Maíz:** Realizar 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

