

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es moderadamente peligroso, dañino, no ingerir. Evitar su ingestión.
- Peligroso si es inhalado, evitar la nube de aspersión.
- Es irritante dermal moderado. Evitar el contacto con la piel o la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo con los ojos.
- No permita el ingreso con niños, personas en general y animales a la zona tratada.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora para el manipuleo, aplicación e ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y lave la ropa contaminada, equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar fuera de la casa, habitación fresco seco.
- Conservar el producto en su envase original y etiquetado. No reenvasar en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: ESTROBILURINAS**
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso cabello y debajo de la uñas.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-13040 (Línea gratuita) O ESSALUD: 423-7600 (Línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos. No disponer con residuos municipales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques con los desechos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia un cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas o en suelos altamente permeables.



Sumi Robin®
20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN

Metominostrobin200 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 423 - SENASA

Titular del Registro:
Sumitomo Corporation del Peru S.A.
Av. José Pardo N° 513 Of. 701 Miraflores, Lima 18 Perú.
Telf.: (511) 242-7991

Formulado por:
SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD.

C Harumi Island Triton Square Office Tower Y 1-8-11, Harumi Chuo-Ku,
Tokyo - Japon

Importado y Distribuido por:
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU.
Av. José Pardo N° 513 Of. 701 Miraflores, Lima 18 Perú.
Telf.: (511) 242-7991

CONTENIDO NETO : 200 Litros
Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUMIROBIN® es un fungicida que actúa en forma protectante y curativa, con actividad sistémica acropétala.

Para la preparación, echar la cantidad de **SUMIROBIN®** a utilizar en la mitad de volumen de agua a aplicar. Completar la cantidad de agua. Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo de cono lleno).

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			L.M.R. (ppm)	P.C. (días)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	%	L/ 200L	L/Ha		
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.05	-	0.10	0.02	14
Arroz	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.15 - 0.20	-	0.10	7

LMR: Limite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta 02 aplicaciones por campaña en un año con un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SUMIROBIN® puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Siempre que **SUMIROBIN®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en vid a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones en instrucciones dadas”.

