

Medida bolsa trilaminada: 23 cm x 16 cm
MARZO 2016
ML

TIRA

PANTONE 293 C

skirla-bit

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Emamectin benzoato..... 1.0 %
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 2.0%
Aditivos..... csp 100.0 %

Reg. PQUA N°-1432 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

Willowood Limited.

17/F, Seaview Plaza, N° 283
Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan.
Hong Kong.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401, La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 419-3000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 100 g

Lote N°:

Fecha de Form.

Fecha de Exp.:

 **MONTANA**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (vapor o aspersión).
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectina (Emamectin Benzoato), Biológico (*Bacillus thuringiensis*)
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, NO INDUCIR AL VÓMITO. Si la persona afectada está consciente y alerta, enjuague la boca y beba leche o agua de 2 - 4 tazas. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia, cuidando que los párpados estén bien abiertos, por lo menos por 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por lo menos por 15 minutos.

- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco y mantenerlo en reposo, en una posición confortable para respirar; si la respiración es dificultosa, ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
MONTANA: 419-3000
ESSALUD: 117 o 0801-10200
CICOTOX: 0-800-1-3040

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SKIRLA BT es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, Emamectin benzoato con propiedad translaminar y con acción de contacto pero principalmente por ingestión causando una parálisis neuromuscular de los insectos y *Bacillus thuringiensis*, el cual actúa por ingestión dañando las células epiteliales del intestino de los insectos provocando inanición y posteriormente la muerte.

SKIRLA BT puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS (KG/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.50 - 0.70	Emamectin benzoato: 7	Emamectin benzoato: 0.01 <i>Bacillus thuringiensis</i> : exento
Espárrago	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	0.40 - 0.60	Emamectin benzoato: 30	Emamectin benzoato: 0.01 <i>Bacillus thuringiensis</i> : exento
Alcachofa	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4 - 0.6	Emamectin benzoato: 1	Emamectin benzoato: 0.1 <i>Bacillus thuringiensis</i> : exento

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

