

21.5 cm

FINKER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Fipronil..... 800 g/kg
Aditivos csp 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Contenido Neto: 10 Kg

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

6th Floor, Gaoxinjishu chuangye
Centre Shunhua Road 750#, Jinan
Shandong- China.
Teléfono: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232

Titular de registro e importador:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°670 Of- C-402. Surco
Lima- Perú.
Teléfono: 511 713-9960



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

36 cm

36 cm

21.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- Este producto es dañino por Ingestión y por inhalación
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Phenylpyrazoles**
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y lavar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. Llevar al médico.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

En caso de EMERGENCIA llamar a:
CICOTOX: Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA: 117 (Opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.

- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FINKER es un insecticida de amplio espectro, tóxico por el contacto e ingestión. Moderadamente sistémico que, en algunos cultivos, puede usarse en aplicación al suelo o semillas. Tiene una excelente acción residual luego de aplicaciones foliares.

Preparación y aplicación:

- Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme.
- Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
- La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- La absorción de **FINKER** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica hasta dos veces por temporada o campaña/año.
Aplicar al inicio de detección de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con fuertes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplotis longifila</i>	80	21	0.1

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

