1cm

# CIGARAL 70 WP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE - WP

**Composición:**

Imidacloprid.....700 g/kg
Aditivos .....c.s.p. 1Kg

**Reg. PQUA N° 1440-SENASA**

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

**Formulado por:**

anasac EAST

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.**
Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel:+86-(0)570-7855158

**Importado y distribuido por:**

hortus

Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU Nº 141097

**Contenido neto** :
Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

1cm
1cm
1cm
1cm

1cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bánese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar aliemntos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar laropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático o de soporte.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0800-1-3040. ESALLUD: 0801-10200.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CIGARAL 70 WP** es un insecticida de última generación con acción sistémica que actúa por contacto e ingestión. Su ingrediente activo es el Imidacloprid cuyo uso está especialmente indicado para el control de insectos picadores y chupadores como pulgones, mosca blanca, queresas y minadores de hoja de brotes y de frutos. **CIGARAL 70 WP** presenta una excelente sistemicidad vía raíces pudiendo usarse a través de sistema de riego presurizado o aplicado directamente al suelo.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**CIGARAL 70 WP** no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: llene de agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del equipo pulverizador. Agregue la cantidad de **CIGARAL 70 WP** según la dosis requerida. Agite la mezcla para homogeneizar y luego complete el tanque hasta el nivel deseado, usando siempre agua limpia. En frutales aplicar altos volúmenes de agua dependiendo del estado de crecimiento.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS (g/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | N. Común | N. científico | | | |
| Mandarina | Minador de los cítricos | *Phyllocnistis citrella* | 40 - 50 | 14 | 0.5 |
| | Pulgón negro | *Toxoptera aurantii* | 50 - 60 | 14 | 0.5 |
| Tomate | Caracha | *Prodiplosis sp.* | 60 - 80 | 14 | 0.1 |
| | Mosca blanca | *Bemisia sp.* | 50 - 60 | 7 | 0.1 |
| Espárrago | Prodiplosis | *Prodiplosis longifila* | 80 | NC | 0.05 |
| Alcachofa | Mosca blanca | *Bemisia tabaci* | 50 | NC | 0.2 |
| Vid | Filoxera | *Phylloxera vitifoliae* | 40 - 50 | NC | 0.1 |
| Páprika | Mosca blanca | *Bemisia tabaci* | 70 | NC | NC |
| Palto | Trips | *Heliothrips haemorrohoidalis* | 50 - 100 | 30 | 0.05 |
| | Mosca blanca | *Aleurodicus dispersus* | 50 | 14 | 0.05 |
| Piña | Cochinilla harinosa | *Dysmicoccus brevipes* | 50 | NC | 0.05 |
| Cebolla | Trips | *Thrips tabaci* | 50 - 60 | 21 | 0.05 |
| Capsicum annum | Prodiplosis | *Prodiplosis longifila* | 50 | 3 | 1.00 |
| Arveja | Prodiplosis | *Prodiplosis longifila* | 50 | 7 | 1.00 |
| Arroz | Cigarrita del virus de la hoja blanca | *Tagosodes orizicolus* | 25 | 30 | 0.05 |
| Maíz | Cigarrita del maíz | *Dalbulus maydis* | 50 | 28 | 0.02 |

LMR: Límite máximo de residuos en ppm. NC= no conocido.
PC: Periodo de carencia en días.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar al inicio de la infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas para reingresar al campo tratado.

**COMPATIBILIDAD: CIGARAL 70 WP** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

1cm

1cm

1cm