

# CIGARAL 70 WP

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**Composición:**

Imidacloprid.....700 g/kg  
Aditivos .....c.s.p. 1Kg

**Reg. PQUA N° XXXX - SENASA**

Titular del registro: HORTUS S.A.  
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

**Formulado por:**



**Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd.**  
Town South Donghua District, Longyou County  
Zhejiang, China  
Tel:+86-(0)570-7855158

**Importado y distribuido por:**



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.  
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido neto : 500 g**

Lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar aliemntos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático o de soporte.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 0800-1-3040. ESALLUD: 0801-10200.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
**CIGARAL 70 WP** es un insecticida de última generación con acción sistémica que actúa por contacto e ingestión. Su ingrediente activo es el Imidacloprid cuyo uso está especialmente indicado para el control de insectos picadores y chupadores como pulgones, mosca blanca y queresas y minadores de hoja de brotes y de frutos. **CIGARAL 70 WP** presenta una excelente sistemicidad vía raíces pudiendo usarse a través de sistema de riego presurizado o aplicado directamente al suelo.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**  
**CIGARAL 70 WP** no presenta inconvenientes para su preparación y aplicación de acuerdo a las indicaciones siguientes: llene de agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del equipo pulverizador. Agregue la cantidad de **CIGARAL 70 WP** según la dosis requerida. Agite la mezcla para homogeneizar y luego complete el tanque hasta el nivel deseado, usando siempre agua limpia. En frutales aplicar altos volúmenes de agua dependiendo del estado de crecimiento.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO        | PLAGAS                                |                                    | DOSIS (g/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                | N. Común                              | N. científico                      |                |           |           |
| Mandarina      | Minador de los cítricos               | <i>Phyllocnistis citrella</i>      | 40 - 50        | 14        | 0.5       |
|                | Pulgón negro                          | <i>Toxoptera aurantii</i>          | 50 - 60        | 14        | 0.5       |
| Tomate         | Caracha                               | <i>Prodiplosis sp.</i>             | 60 - 80        | 14        | 0.1       |
|                | Mosca blanca                          | <i>Bemisia sp.</i>                 | 50 - 60        | 7         | 0.1       |
| Espárrago      | Prodiplosis                           | <i>Prodiplosis longifila</i>       | 80             | NC        | 0.05      |
| Alcachofa      | Mosca blanca                          | <i>Bemisia tabaci</i>              | 50             | NC        | 0.2       |
| Vid            | Filoxera                              | <i>Phylloxera vitifoliae</i>       | 40 - 50        | NC        | 0.1       |
| Páprika        | Mosca blanca                          | <i>Bemisia tabaci</i>              | 70             | NC        | NC        |
| Palto          | Trips                                 | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> | 50 - 100       | 30        | 0.05      |
|                | Mosca blanca                          | <i>Aleurodicus dispersus</i>       | 50             | 14        | 0.05      |
| Piña           | Cochinilla harinosa                   | <i>Dysmicoccus brevipes</i>        | 50             | NC        | 0.05      |
| Cebolla        | Trips                                 | <i>Thrips tabaci</i>               | 50 - 60        | 21        | 0.05      |
| Capsicum annum | Prodiplosis                           | <i>Prodiplosis longifila</i>       | 50             | 3         | 1.00      |
| Arveja         | Prodiplosis                           | <i>Prodiplosis longifila</i>       | 50             | 7         | 1.00      |
| Arroz          | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes orizicolus</i>        | 25             | 30        | 0.05      |

LMR: Límite máximo de residuos en ppm. NC= no conocido.  
PC: Periodo de carencia en días.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**Aplicar al inicio de la infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas para reingresar al campo tratado.

**COMPATIBILIDAD:** **CIGARAL 70 WP** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

