

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- La aplicación de MIMOTEN debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer, ni beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- MIMOTEN no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y airado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Retirarse para respirar aire fresco a un lugar abierto.
- Ingestión: Busque asistencia médica.
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente muestrele una copia de esta etiqueta.

**NOTA AL MEDICO:**

- Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- DL50 ORAL AGUDA: >2000 mg/kg de peso corporal
- DL50 DERMAL: >2000 mg/kg de peso corporal

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

# MIMOTEN®

EXTRACTO VEGETAL

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

Extracto de mimosa ..... 840 g/L.  
Aditivos ..... C.s.p. 1 L.

**PBUA-219-AG-SENASA**

Titular del Registro:

**ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.**

Av. Ignacio Merino N° 1926, Of. N° 503, Lince, Lima, Lima  
Teléfono: 951 376 792

Formulado por: Bioatlántica S.A.

Dirección: Ctra. al Polvorín, 33 Calle Entrada  
Principal a Colonia Perfecto Vázquez  
San Pedro Sula - HONDURAS  
Teléfono: +504 560 0042/43/44  
Web: <http://www.atlanticahonduras.com>



Distribuido por:

**ATLANTICA AGRICOLA PERU S.A.C.**

Av. Ignacio Merino N° 1926, Of. N° 503, Lince, Lima, Lima  
Teléfono: 951 376 792

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 5 Litros

Número de lote:

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- MIMOTEN Es un fungicida botánico capaz de controlar oidium y botrytis en diferentes cultivos.
- Debe aplicarse en aspersión (preferiblemente) o en lavado garantizando una muy buena cobertura en toda la superficie foliar (haz y envés).
- Por tratarse de un producto biodegradable y de baja persistencia debe ser aplicado de forma preventiva por lo menos una vez a la semana de forma regular y continua.
- En cualquier momento de desarrollo de la planta, preferiblemente antes de la aparición de síntomas o signos de la enfermedad o en su defecto cuando estos comiencen su aparición.
- Es muy efectivo en el marco de programas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC), pues previene y controla la aparición de éstas enfermedades.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme. Luego echar en el cilindro de aplicación.
- Es preferible usar un coadyuvante convencional para mejorar la humectación en los tejidos vegetales.

**“Consulte con un Ingeniero Agronomo”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	UAC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Cil	Días	ppm
Vid	<b>“OIDIUM”</b>	<i>Uncinula necator</i>	1.0	0	Exento
Vid	<b>“BOTRITIS”</b>	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	0	Exento
Alcachofa	<b>“BOTRITIS”</b>	<i>Botrytis cinerea</i>	0.75 a 1.0	0	Exento
Alcachofa	<b>“OIDIUM”</b>	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	0	Exento
Pimiento	<b>“BOTRITIS”</b>	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	0	Exento
Pimiento	<b>“OIDIUM”</b>	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	0	Exento
Café	<b>“ROYA”</b>	<i>Hemileia vastatrix</i>	1.0	0	Exento

UAC: Última Aplicación a la Cosecha | LMR: Limite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

La frecuencia y época de aplicación dependerá del nivel de la infección del patógeno.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área aplicada después de las 24 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- Puede ser utilizado en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y de manejo integrado de cultivos (MIC)

**FITOTOXICIDAD**

- MIMOTEN no presenta fitotoxicidad en los cultivos ensayados utilizando las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



**PRECAUCIÓN**

